

The background features a central white circle surrounded by multiple layers of green and grey swirling lines. In the top-left and bottom-right corners, there are clusters of green leaves and stems, some with buds, adding a natural, organic feel to the design.

Зайцы

**Что за зверь такой
лесной,
Встал как столбик под
сосной?
Кто стоит среди травы,
Уши больше головы?**





**Прокатился шум
лесной**

**Под кустом притих
косой.**

**Уши длинные
прижал...**

Долго эхо провожал.

Заяц - беляк

**Заяц - беляк или
лесной заяц,
житель лесных и
горных районов.
Зимой мех
становится белым
или серо-голубым,
что позволяет ему
надёжно
прятаться в снегу
от голодных
хищников.**



Секрет белого меха

Зимой заячья шуба полностью белая, кроме кончиков ушей. Они всегда чёрные. Зимняя шуба тёплая, потому что каждый волосок внутри полый, как трубочка. Это помогает зайцу хорошо себя чувствовать и не мёрзнуть зимой. Внутри полого волоска стоит воздух, и от этого тепло сохраняется дольше.



Летней шубе волоски в шкуре коричневого зайца внутри не полые, а сплошные. Из-за этого тепло уходит из его тела быстрее.



В середине осени заяц начинает терять свой коричневый мех и отращивает вместо него белый.





Заяц - русак

Заяц-русак несколько крупнее беляка. Летом русак желтовато-палево-рыжий, ярче беляка. На юге его зимняя окраска не отличается от летней, лишь мех становится более густым и пышным. В северной части ареала этот заяц частично белеет, но спинка у него всегда остается бурой. Русак - житель открытых пространств.





Американский беляк

Американский беляк большую часть жизни проводит в лесах или в густых кустарниковых зарослях. Только изредка он появляется на открытых поросших травой местах, этим он отличается от других зайцев и кроликов. Американские беляки держатся группами. Небольшие группки этих животных вместе отправляются на поиски корма и отдыхают




Калифорнийский заяц



Калифорнийский заяц обитает полупустынных районах. У него рыжевато-бурая шерсть, сливающаяся по цвету с убогой и сухой растительностью окружающей местности. Напуганный заяц бежит быстрее скаковой лошади, перепрыгивая через камни и кусты. Калифорнийский заяц может развить скорость до 80 км. в час и прыгнуть вверх на 1,5 м. Уши длиной 20см. Их невероятно развитые ушные раковины, возможно, одно из необходимых приспособлений для регулирования температуры тела в сухом, жарком климате: большая поверхность позволяет быстрее растрчивать излишнее количество тепла, при этом не происходит потовыделения, которое привело бы к потере драгоценной влаги.

Флоридский кролик

Флоридский кролик, которого еще называют кролик-ватный хвост, населяет большинство восточных штатов США. Кролик-ватный хвост живёт на лесных опушках, где лес ограничит с открытой местностью. Если бы детёныши флоридского кролика достигали взрослого возраста, потомство одной пары через 5 лет исчислялось бы 350 000.



**Спасибо за
внимание**