



ПУШНОЕ ЖИВОТНОЕ
СОБОЛЬ
А.

СОСНОВСКАЯ Н.



МЕХ ПЫШНЫЙ, ШЕЛКОВИСТЫЙ, С
БЛЕСТЯЩЕЙ ОСТЬЮ. ОБЩАЯ ОКРАСКА
МЕХА ИЗМЕНЯЕТСЯ ОТ СВЕТЛОЙ
ЖЕЛТОВАТО-БУРОЙ ДО ТЕМНОЙ
ЧЕРНОВАТО-КОРИЧНЕВОЙ.

ДЛИНА ТЕЛА У СОБОЛЕЙ
ПОДВЕРЖЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ
КОЛЕБАНИЯМ: У САМЦОВ ОНА
КОЛЕБЛЕТСЯ ОТ 40 ДО 56 СМ, У
САМОК – ОТ 35 ДО 47 СМ. ХВОСТ С
КОНЦЕВЫМИ ВОЛОСАМИ
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО РАВЕН 1/3 ДЛИНЫ
ГОЛОВЫ И ТУЛОВИЩА И ЕДВА
ВЫДАЕТСЯ ЗА КОНЦЫ ВЫТЯНУТЫХ
ЗАДНИХ НОГ; ЧИСЛО ХВОСТОВЫХ
ПОЗВОНКОВ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 16.
ПОДОШВЫ ЛАП ПОКРЫТЫ ГУСТЫМИ,
ЖЕСТКИМИ ВОЛОСАМИ.



Соболь — зверок оседлый; лишь значительный неурожай кормов, пожары, рубка леса и другие подобные факторы вызывают его переселения.

НА УЧАСТКЕ ОБИТАНИЯ СОБОЛЬ ПРОДЕЛЫВАЕТ ЗВЕЗДООБРАЗНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ СУТОЧНЫЕ ХОДЫ. ЗИМОЙ СОБОЛЬ УДАЛЯЕТСЯ ОТ ГНЕЗДА НА 2-3 КМ, ПРИЧЕМ КАЖДЫЙ ЗИМНИЙ ВЫХОД, ЗВЕРКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОЛЬЦО С ВОЗВРАЩЕНИЕМ К ГНЕЗДУ. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА ОБИТАНИЯ КАЖДОГО СОБОЛЯ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВИСЯТ ОТ КОРМОВЫХ УГ



Соболь питается как животной, так и растительной пищей.

В различные сезоны года видовой состав кормов изменяется. Круглогодичными кормами соболя являются различные виды мышевидных грызунов, обитающих в тайге. Дополнительными кормами в течение года служат белки, зайцы, куриные птицы и кедровые орехи (зимой). Летом состав кормов соболя разнообразнее, так как он поедает, кроме грызунов, яйца птиц и пресмыкающихся, различные ягоды. Особенно хорошо он ест бруснику и рябину.



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
СОБОЛЯ НЕИЗВЕСТНА. В ОДНОМ
ЗВЕРОСОВХОЗЕ САМКА В
ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ РОДИЛА ЕЩЕ
ДВУХ СОБОЛЯТ. ПРОЦЕСС ЛИНЬКИ
У СОБОЛЯ ИЗУЧЕН
НЕДОСТАТОЧНО. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО
СОБОЛИ ЛИНЯЮТ ДВА РАЗА В
ГОД—ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ

Выделанные шкурки соболей употребляются для изготовления высокоценных меховых изделий — воротников, горжеток и головных уборов. Шкурки темной расцветки употребляются в натуральном виде. Шкурки светлой окраски обычно подкрашиваются под темные.



www.zooexpo.plJPEG,
ferrettips.tumblr.comJPEG,
mojafretka.blox.plJPEG,
totallylegit.wordpress.comJPEG,
vk.comJPEG,
Fishing.kz