

# Летяга



Редкий вид млекопитающих. Длина тела до 20 см, хвоста до 14 см, масса 100—120 г. Летяга обыкновенная населяет лесную зону Евразии вплоть до Сахалина, повсеместно немногочисленна и предпочитает держаться лиственных и смешанных лесов .



РАЗМНОЖЕНИЕ ЛЕТЯГИ ИЗУЧЕНО ПЛОХО. У САМКИ 1 РАЗ В ГОД РОЖДАЕТСЯ ПО 2-4 ДЕТЁНЫША. БЕРЕМЕННОСТЬ ДЛИТСЯ 4-5 НЕДЕЛЬ. ПЕРВЫЙ ВЫВОДОК ПОЯВЛЯЕТСЯ В АПРЕЛЕ-МАЕ, ВТОРОЙ — В КОНЦЕ ИЮНЯ — НАЧАЛЕ ИЮЛЯ. ДЕТЁНЫШИ ГОЛЫЕ И СЛЕПЫЕ; ПРОЗРЕВАЮТ В 15-ДНЕВНОМ ВОЗРАСТЕ. НА 36-41 ДЕНЬ ЖИЗНИ ВПЕРВЫЕ ВЫХОДЯТ ИЗ ГНЕЗДА. ПО ДОСТИЖЕНИИ 43-45-ДНЕВНОГО ВОЗРАСТА НАЧИНАЮТ СОВЕРШАТЬ ПЕРВЫЕ ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПРЫЖКИ, С 50-ДНЕВНОГО — ПЛАНИРОВАТЬ. ПОСЛЕ 50 ДНЯ ЖИЗНИ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕХОДЯТ НА ВЗРОСЛОЕ ПИТАНИЕ И СТАНОВЯТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ. ЖИВУТ ЛЕТЯГИ (В НЕВОЛЕ) ДО 9-13 ЛЕТ, В ПРИРОДЕ — ВСЕГО 5 ЛЕТ. ИХ ПРИРОДНЫЕ ВРАГИ — КРУПНЫЕ СОВЫ, РЕЖЕ СОБОЛЬ, КУНИЦЫ



# БУРЫЙ МЕДВЕДЬ



Бурый медведь — очень крупный массивный зверь, один из самых больших наземных хищников. В пределах семейства бурый медведь уступает в размерах лишь белому медведю. Самые крупные из бурых медведей живут на Аляске, их называют кодыяки, длина тела кодыяков достигает 250 см, высота в холке 130 см, вес до 750 кг. Лишь немного уступают им в размерах медведи, обитающие на Камчатке. В средней полосе России вес «типичных» медведей составляет 250-300 кг.



Самки приносят потомство раз в 2-4 года. Течка у них продолжается с мая по июль, 10-30 дней. В это время самцы, обычно молчаливые, начинают громко реветь, и между ними возникают жестокие схватки, иногда заканчивающиеся смертью; победитель может даже съесть побеждённого. Самка спаривается с несколькими самцами.







# Бурундук



Бурундук - близкий родственник белки. Это маленький подвижный зверек с нарядной шубкой и пушистым хвостом. Окрашен он в светло серый или рыжий цвет с пятью продольными черными, четко выделяющимися полосами. Ареал обитания бурундуков очень широк - от реки Вятки до Южно-Курильских островов и от Монголии до Анадыря. Особенно много его в кедрово-широколиственных лесах Амуро-Уссурийского края, где на одном квадратном километре в очень благоприятные годы живет двести-триста, а то и до шестисот грызунов. Лишь немногим меньше их в кедрачах Алтая, в Саянских горах и в Прибайкалье.





Живя поодиночке, бурундуки охраняют свою территорию и нору от вторжения сородичей. Только ради спаривания самцы и самки в определённое время года ищут контакт друг с другом. Первые детёныши рождаются в мае; второй помет появляется на свет обычно в августе. У азиатского бурундука, в отличие от восточного, обычно один помет 4-10 детёнышей (лишь на юге ареала — 2 выводка)<sup>[3]</sup>. После беременности продолжительностью тридцать дней на свет появляются четыре или пять детёнышей. Уже на первом году жизни они становятся половозрелыми. В то время как бурундуки в дикой природе, как правило, не выживают более чем три года, в неволе они могут достигать возраста десяти лет.





# РЫСЬ



Длина тела рыси составляет 82-105 см и 70 см в холке. Обычно, рысь размером с крупную собаку. Самцы чаще весят от 20 до 30 кг, а самки весят в среднем 20 кг, что чуть больше оцелота. Туловище, как у всех рысей, короткое, плотное. Лапы крупные, зимой хорошо опушенные, что позволяет рыси ходить по снегу, не проваливаясь. На ушах длинные кисточки. Хвост короткий, как бы обрубленный.







Гон у рыси в марте, и в эту пору рыси, обычно молчаливые, издают громкие крики, урчание и мяуканье. Беременность у самок длится 63—70 дней. В выводке обычно 2—3 рысёнка; убежищем им служит логово под вывернутыми корнями упавшего дерева, яма, земляная пещера или расщелина скал. В воспитании котят участвуют оба родителя. Выводок охотится вместе со взрослыми до наступления следующего сезона размножения. Половой зрелости самки достигают в 21 месяц, самцы — в 33 месяца. Продолжительность жизни — 15—20 лет.





# ПОЛЁВКА



**Полёвки - мелкие грызуны, внешне очень схожие с мышами или крысами, но отличаются от них тупой мордой, короткими ушами и хвостом, не превышающим  $3/4$  длины тела; коренные зубы плоские, с резко выступающими по бокам углообразными краями.**

Питаются полевки преимущественно зелеными частями растений, семена поедают редко, поэтому борьба с ними намного сложнее, чем с мышами. Численность полевок подвержена резким колебаниям. В некоторые годы среди многочисленных зверьков вспыхивают эпизоотии различных инфекций, опасных для человека и домашних животных,





**Полевки очень плодовиты.** Родившиеся весной самки при благоприятных условиях способны размножаться уже в возрасте 13 суток, а самцы 40—45 суток. Беременность длится 18—20 суток. В год обыкновенные полевки дают 3—4 выводка, в среднем по 5—6 детенышей в каждом. Эти мелкие зверьки являются настоящим бичом для огородов и садов. Зимой они губят молодые фруктовые деревья, обгрызая на них кору, а также поедают продукты, хранящиеся в амбарах, кладовках и других хозяйственных постройках.





ЛЕТЯГА,  
БУРЫЙ  
МЕДВЕДЬ,  
БУРУНДУК,  
РЫСЬ,  
ПОЛЁВКА.

Сделала ученица 4 а  
класса Хаерварова  
Регина осн.общ. П  
Межозёрный