


ВЫМЕРШИЕ ЖИВОТНЫЕ

Презентация воспитателя Ковалёвой Зои Вячеславовны

КВАГГА

- Квагга один из видов зебр. От других зебр отличалась более слабо развитыми поперечными полосами на туловище и на ногах. Последняя дикая особь погибла в 1878 году, а в амстердамском зоопарке квагга просуществовала до 1883 года.



ТИЛАЦИН: СУМЧАТЫЙ ВОЛК

- Сумчатый волк был одним из самых крупных хищных сумчатых. В длину тилацин достигал 100-130 см, вместе с хвостом 150-180 см; высота в плечах - 60 см, вес - 20-25 кг. Удлиненная пасть могла открываться очень широко, на 120 градусов: когда животное зевало, его челюсти образовывали почти прямую линию.


Последний дикий тилацин был убит 13 мая 1930 года, а в 1936 году в частном зоопарке в Хобарте умер от старости последний тилацин, содержащийся в неволе. Сумчатый волк, возможно, выжил в глухих лесах Тасмании. Время от времени появляются сообщения об обнаружении этого вида. В марте 2005 года австралийский журнал предложил 1 025 000 рублей награды тому, кто поймает живого тилацина, однако ни одна особь не была поймана или хотя бы сфотографирована.



МОРСКАЯ КОРОВА

- Малоподвижное беззубое темно-бурое животное длиной до 10 метров с раздвоенным хвостом обитало в мелких бухтах, практически не умело нырять, питалось водорослями. Открыта в 1741 году Георгом Стеллером. Животное совершенно не боялось людей и безжалостно истреблялось. В основном люди использовали подкожный жир и мясо морских коров. К 1768 году Стеллерова корова была полностью истреблена.

Стеллерова корова установила печальный рекорд человеческой безрассудности - от открытия вида до истребления прошло чуть более четверти века. Георг Стеллер остался единственным натуралистом, кто видел этих животных живыми и оставил истории подробное описание вида. Из недостоверных источников сообщалось, что в 1970-х годах Стеллерову корову видели у берегов Камчатки.



ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛЕВ


- Европейский лев - был современником древних Греков и Римлян. Ареал обитания единственного крупного представителя кошачьих на европейском континенте распространялся по всему югу, вдоль берегов средиземного моря и встречался на территории современных Балкан, Италии, Франции, Испании и Португалии. У греков, римлян и македонцев лев был популярным объектом охоты и часто участвовал в римских гладиаторских боях, в качестве заведомой жертвы.

Уже к началу первого тысячелетия Европейские львы были практически истреблены. Последний из Европейских львов был убит в Греции около 100 г. н. э.



ТУР

- Ирландский лось обитал в континентальной Европе 10 000 лет назад, мог похвастаться гигантскими рогами. У экземпляра, найденного в болотистой местности в Ирландии расстояние между рогами составляло 4,3 метра, что соответствует высоте в холке 1,83 метра и весу 500 кг. До сих пор продолжаются дискуссии о причинах вымирания вида.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!