

# ***Заяц-беляк***





**Заяц-беляк** (*Lepus timidus*) является одним из широко распространенных видов семейства зайцевых, наряду с [русакom](#). Область распространения грызуна охватывает полярный, субполярный и умеренный пояс Евразийского материка.

#### **Среда обитания:**

- В России распространён на большей части территории, обитает в тундровой, лесной и частично лесостепной зонах.
- Хотя беляк и тяготеет к лесистым местностям, но сплошных лесных массивов избегает, предпочитая им леса, разреженные лугами и кустарниками.
- Название свое беляк получил благодаря почти полностью белому, окрасу в зимний период, хотя в некоторых частях ареала, где смена времен года слабо выражена, заяц может быть белым круглогодично, или не одеваться в белый мех вовсе. Еще одним отличительным признаком животного является отсутствие на хвосте отметины черного цвета, присущей другим видам.



### Размер:

- Наиболее крупные беляки живут в тундре Западной Сибири, длина их тела до 70 см, а масса до 5,5 кг. Самые мелкие населяют тайгу Якутии, масса таких беляков 2,5-3 кг.

### Внешний вид:

- Уши длинные – 7,5-10 см. Хвост обычно белый; относительно короткий и округлый, длиной 5-10,8 см. Лапы сравнительно широкие; ступни, включая подушечки пальцев, покрыты густой щёткой волос.

### Поведение и образ жизни:

- Беляк в лесу больше полагается на слух, зрение и обоняние у него слабые. Скрываясь, он чаще, чем русак затаивается и залегает. Русак на ходу нередко останавливается, пытаясь увидеть врага. А врагов у зайцев тьма: охотники, волки, лисицы, собаки, орлы, совы. Зайцев спасает их способность быстро бегать: во время погони они могут пробежать за час 70 км.
- Заяц беляк преимущественно сумеречное и ночное животное. Наиболее активен в предутренние и предвечерние часы. Обычно кормёжка начинается с заходом солнца и заканчивается к рассвету.
- День заяц проводит на площадке, которую чаще всего устраивает, просто приминая траву в укромных местах. Выбор места для лежки зависит от сезона и погодных условий. Зимой в сильные морозы заяц роет в снегу норы 0,5-1,5 м длиной, в которых может проводить целый день и покидать лишь при опасности. Роя нору, беляк уплотняет снег, а не выбрасывает его наружу.
- С места лёжки к месту кормёжки зайцы бегают по одному и тому же маршруту, особенно зимой.



### Питание:

- Беляк – растительноядное животное.
- Весной зайцы скапливаются на лужайках с молодой травой стайками по 10-30 голов и с жадностью поедают её. В это время они подчас так увлекаются кормлением, что теряют свою обычную осторожность. Как и все растительноядные животные, беляк испытывает дефицит минеральных солей. Поэтому он периодически поедает почву и заглатывает мелкие камешки. Охотно посещает солонцы, грызёт кости павших животных и сброшенные лосями рога.
- Летом он кормится зелёными частями растений; отдавая предпочтение клеверу, одуванчику, мышиному горошку, тысячелистнику, золотарнику, подмареннику, осокам, злакам.
- Осенью, по мере высыхания травы, зайцы начинают есть мелкие веточки кустарников.
- Зимой беляк кормится побегами и корой различных деревьев и кустарников. Практически повсеместно в его рацион входят различные ивы и осина. Берёзы и лиственницы служат важным источником пищи, особенно в северных и восточных районах. На юге беляк питается побегами широколиственных пород — дуба, клёна, лещины.

### Размножение:

- Сезон размножения длится 2-4 месяца. В средней полосе обычно размножается дважды за лето, на севере – один раз. Молодняк становится взрослым лишь после зимовки.
- Зайчата (1-6, реже до 12) рождаются зрячими, с густым мехом и первое время сидят в траве неподвижно, чтобы не оставлять следов, а мать приходит их кормить 1-2 раза за ночь. При этом она кормит не только своих зайчат, но и чужих. В местах, где зайцев много, все зайчата порой становятся общими.

### Продолжительность жизни:

- В природных условиях зайцы-беляки живут 8-9 лет.