

# Окружающий мир 4 класс

Природные зоны.  
Обобщающий урок.

Презентацию выполнил  
ученик 4 «А» класса  
Иван Нуриев.

# Животные пустыни. Западный удавчик.

выполнил:

ученик «А» класса  
Гимназии № 498  
Нуриев Иван.



## **ПОЗВОНОЧНЫЕ – VERTEBRATA**

**Отряд:** Змеи – Serpentes

**Семейство:** Ложноногие , или удавы – Boidae

**Род:** Eryx

**Категория:** 3 - редкий вид на периферии ареала

**Занесен в Красную Книгу России**


## *Внешний вид, питание:*

Средних размеров змеи, длина тела с хвостом у самок достигает 870 мм, самцы несколько мельче. Хвост очень короткий — 40-60 мм, тупо закругленный. Выпуклая голова не ограничена от туловища, сверху покрыта многочисленными мелкими щитками неправильной формы.

Питаются различными мелкими позвоночными: ящерицами, грызунами и птицами адекватных размеров.

# *Окраска:*

Верхняя сторона тела от темно-пепельного до желтовато-коричневой; вдоль спины располагаются в 1-2 ряда бурые или черные вытянутые поперек пятна. Мелкие темные крапинки проходят рядами по бокам тела. Голова сверху одноцветная или с темными крапинками. Нижняя сторона тела, включая нижнюю поверхность головы, светлая с темными пятнами. У молодых особей брюхо ярко-розовое.



# *Распространение:*

Вид распространен в северо-восточной Африке, на севере Аравийского полуострова, в Малой Азии, Сирии, Иране, Ираке, Палестине, в южной Европе на Балканском полуострове. В пределах Кавказа известен в южной Армении, восточной Грузии, Азербайджане. Известен даже с острова Наргин в Каспийском море близ Баку. В России встречается в Дагестане, Чечне, на юге Ставропольского края. Известны единичные находки в окрестностях Грозного, станицы Старогладковской в Чечне, в Карапогае и Малой Арешевке в Дагестане и в районе южных Ергеней в Калмыкии и в южной Калмыкии в урочищах Манджекины и Джеджекины.

# *Местообитания:*

Населяет открытые сухие степи и полупустыни. Придерживается глинистых и каменистых почв, реже встречается на слабозакрепленных бугристых песках, в виноградниках и в садах, на Кавказе по долинам рек доходит до высоты 1500-1700 м над уровнем моря. На северной границе распространения — в южной России отмечен также и в типчаково-полынной степи. Везде местообитания вида приурочены к аридным ландшафтам.



# *Активность, размножение:*

Ведет скрытный образ жизни, скрываясь под камнями, в норах грызунов и птиц.

В жаркие дни прячется в этих убежищах и охотится ночью или в сумерках. Активность сугубо сумеречная и ночная. День проводит под камнями или в норах грызунов, хорошо зарывается в мягкий грунт. В дневное время на поверхности удавчика можно встретить только ранней весной. В активный период линяют один раз в 1-2 месяца. Молодые особи линяют чаще.

Выход после зимовки происходит в марте-апреле, активность продолжается до начала октября. Сначала на поверхности появляются самцы, через 10-15 дней выходят самки. Спаривание повторяется несколько раз. Беременность длится около 5 месяцев. В августе-сентябре самка рождает 4-20 детенышей длиной 120-150 мм.