

Животный мир Прибайкалья

- Территория Иркутской области находится в лесном природном комплексе, который разрежен островами степей и лесостепей.
- Значительная ее часть занята горно-таежными и горно-тундровыми природными комплексами.
- Орнитологами учтено 326 видов птиц, из которых гнездится в области 274 вида.

Птицы сибирского леса

- В фауне Прибайкалья птицы – самый многочисленный класс позвоночных животных.
- Птицы Прибайкалья условно делятся на несколько экологических групп: таежные, лесов и кустарников, птицы открытых пространств, птицы высокогорий, околородные и водные птицы.

Ворона



Вид по окраске оперения распадается на два вида: серую и черную.

Ворона часто оседлая, частично перелётная птица. Зиму проводит у жилья человека.

В апреле – мае откладывают 4-5 яиц зеленоватой или зеленой окраски с тёмными пятнышками и крапинками. Насиживание 17-20 дней. Птенцы в возрасте 5 недель становятся вполне лётными.

Ворона – всеядная птица.

Снегирь



Одна из широко известных и заметных птиц лесов.

Питаются преимущественно растительной пищей – семенами деревьев, почками, побегами.

На зиму откочёвывают далеко за пределы гнездовой области.

4-7 голубоватых яиц
высиживает самка, самец
изредка меняет и
подкармливает. Птенцы
появляются через 13 – 15 дней.

Большой пестрый дятел



Красивая, очень пестрая птица. Преобладающая окраска её состоит из сочетания черных и белых тонов. У самца красное пятно на хохолке.

Большую часть времени дятел проводит в поисках пищи. Обнаружив под корой насекомых, дятел сильными ударами клюва пробивает воронку, а липким длинным языком достает личинок и взрослых насекомых.

Осенью и зимой питается семенами хвойных растений.

Клёст



Несколько крупнее снегиря. Замечателен своеобразным строением клюва. Надклювье и подклювье скрещиваются между собой.

Оперение самца ярко-красного цвета. У самок красный цвет замещён зеленовато-серым и желто-серым.

Яйца (от 2до5) насиживает самка 12-13 дней.

Птенцы остаются в гнезде 14 дней, но и после вылета родители продолжают их выкармливать.

Сорока



Оперение мягкое, густое, черного цвета с белым брюхом. На большей части ареала оседлая птица и лишь в зимнее время совершает небольшие кочевки. Живет парами.

Сорока – всеядная птица. Большое место в ее кормовом рационе занимают насекомые.

Глухарь



Одна из самых крупных птиц семейства тетеревинных.

Вес самца – 3,5 – 6,5 кг, самки – 1,7 – 2,3 кг.

Это большая неуклюжая и пугливая птица. Полет тяжелый, шумный.

У глухаря ярко выражен половой диморфизм. Самец крупнее и резко отличается от самки по окраске оперения.

Ушастая сова



Самец и самка окрашены одинаково: спина охристая с темно-бурыми полосами. Гнездится обычно в старых гнездах других птиц, реже в дуплах. Число яиц 4-5, в кормовые годы 7-9. В четырёхнедельном возрасте молодняк становится на крыло. Пищу ушастой совы составляют разные грызуны, иногда птицы.

Грач



Птица величиной с ворону, но стройнее, имеет более приятный и тонкий клюв. Оперение черное с металлическим блеском.

Гнездится колониями в садах, парках и на деревьях в поселениях человека.

В кормовом рационе жирная пища.

Серебристая чайка



Одна из крупных чаек: вес от 700 до 1600 граммов. Оперение белое, за исключением голубовато-серой спины и крыльев.

Сильная, смелая и агрессивная чайка с повадками хищника.

Питается рыбой, грызунами, птенцами других птиц.

Гнездится колониями и редко одиночными парами.

Ореховка



Тело окрашено в темно-коричневато-бурый цвет с белыми пятнами, которых нет только на верхней стороне головы. На конце хвоста светлая кайма.

Типично лесная птица, ловко прыгает по ветвям хвойных деревьев, подвешивается к шишкам на елях.

Предпочитает еловые, кедровые леса.

Запасает корма на земле подо мхом, лишайниками, под корой.

Собирает орехи в особый мешочек под языком.

Рябчик



Живя в лесу рябчик большее время обитает на земле, бегают быстро, ловко взбирается на поваленные деревья.

Гнездится под кустом, где есть мох, травинки и мелкие прутики. Полная кладка 6-10 яиц.

Летом поедает преимущественно семена, насекомых, а осенью - ягоды.

В желудке рябчика всегда присутствуют камешки, способствующие перетиранию жесткой пищи.

Мухоловка



Распространена в Сибири.

Окраска взрослого самца черно-белая, контрастная; на лбу белое пятно, хвост буровато-черный с белой каемкой по краям. Самки окрашены более тускло.

Поют Ци-кру, ци-кру-ци, ци-кру-тт-и

Гнездо представляет собой кучку сложенную из сухих травинок бересты или пленок коры сосны.

Ласточка



Прекрасные летуны, значительную часть жизни проводят на лету, даже пьют на лету. Стремительно проносясь с поднятыми крыльями и вытянутой вниз шеей над самой поверхностью воды и черпая ее подклювьем.

Гнезда эти птицы строят на скалах, в обрывах. Некоторые виды устраивают их в береговых обрывах.

Пища ласточек состоит из насекомых: мелкие мухи, комары.

Воробьиный сыч



Самый северный вид сычиков распространенный в нашей стране. Окраска: общая окраска спины бурая с сероватым оттенком, с беловатыми пестринами, клюв желтый, когти черные.

Кладка из 2-3 яиц в конце апреля.

Для воробьиного сычика характерно собирание запасов пищи в особенности зимой. Эти запасы убитые сычиком мышевидные грызуны.

Синица



Синицы – подвижные, ловкие птички, питающиеся преимущественно насекомыми, истребляют вредителей растений. Они очень общительны. Осенью часто собираются в стаи, объединяясь с другими видами синиц, дятлами и поползнями.