


Зимующие птицы Кузбасса



ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ

Это маленькая подвижная птичка с округлой головкой, короткой шеей, яйцевидным туловищем, короткими и округлыми крыльями. Клюв твердый, к концу заостренный. В холодную пору птицы сидят, плотно прижавшись, друг к другу, нахохлившись.

Почему его так назвали?

Воробьи очень прожорливые птички. Часто они летают по полям и садам и истребляют не только насекомых, но и вредят урожаю. Само название говорит об этом: «Вора бей!» - кричали крестьяне, когда видели, как воробей уничтожает их посевы.



воробей



Голубь



Эти птицы могут жить не только на воле, то есть на улицах города, в лесу, скалах, но еще и у человека. Человек строит птицам хороший дом. В городе они живут под крышами домов, на чердаках или строят себе гнезда на деревьях.



Сорока



Оперение мягкое, густое, черного цвета с белым брюхом. На большей части ареала оседлая птица и лишь в зимнее время совершает небольшие кочевки. Живет парами.

Сорока – всеядная птица. Большое место в ее кормовом рационе занимают насекомые.



ворона



- Серая ворона -голова, крылья и хвост черные, остальное оперение темно-серое.
- Они не избегают людей, а пользуются свалками, отбросами, которые возникают возле жилья человека.
- Серая ворона – это разбойница, она разбивает яйца других птиц.



Хвост - работник.

- Хвост у дятла первый работник.
- Дятел хвостом упирается, когда клювом работает;
- спит дятел, сидя на хвосте и вцепившись коготками в стенки дупла;
- во время прыжка, дятел хвостом отталкивается.



Снегирь



Одна из широко известных и заметных птиц лесов.

Питаются преимущественно растительной пищей – семенами деревьев, почками, побегами.

На зиму откочёвывают далеко за пределы гнездовой области.

4-7 голубоватых яиц высиживает самка, самец изредка меняет и подкармливает. Птенцы появляются через 13 – 15 дней.



Синица



Синицы очень полезны нашим лесам, они истребляют в гнездовой период гусениц, а также яички и куколки насекомых. Синица собирает 500-600 гусениц в день. Пара синичек, поселившись в саду, может сохранить от вредных насекомых до 40



Клёст

Птица получила своё название за клюв, напоминающий клещи. Клюв её загнут крест на крест, как будто сжат, а по-древнерусски «клестить» означало сжимать, стискивать.





Ушастая сова - Лицевой диск округлый. Глаза круглые, крупные. Окраска перьев пёстрая. На голове 'ушки' из удлинённых перьев. Совы широко распространены в нашей стране - от арктической тундры до тропических лесов. Питаются различными грызунами, которых ловят ночью.



Филин (вид, находящийся под угрозой исчезновения)



- * Обитает в Европе, Северной Азии. В Татарстане отмечен в Высокогорском, Зеленодольском, Мамадышском, Лаишевском, Верхнеуслонском, Буинском, Мензелинском, Альметьевском, Камско-Устьинском, Тетюшском районах.
- * Оседлый вид. Обитает в перестойных хвойных, смешанных и лиственных лесах. Гнездится в дуплах, пнях, иногда на земле. В кладке обычно 2—3 яйца. Основа питания — мышевидные грызуны.
- * Причины исчезновения: Вырубка перестойных лесонасаждений, применение ядохимикатов.
- * Охраняется в заказниках.



Свиристель величиной со скворца. Оперение серое. Горло и полоска от клюва к глазу черные, лоб красноватый. На голове большой хохол. На конце хвоста поперечная желтая полоса. Кочующая птица. Населяет север лесной зоны от Кольского полуострова до Камчатки. Гнездо строит на дереве. В природе легко определяется по характерной внешности.

