

Виды



доврачебной

помощи

1 урок. Измерение температуры.





Что делать при плохом самочувствии?



Чем помочь себе и близким?

- **Самое первое, что нужно сделать – измерить температуру.**
- **Если плохо и болит голова – измерить давление.**
- **Если ты диабетик – срочно измерить уровень сахара в крови.**



- **Доврачебная помощь** - это оказание помощи людьми, не имеющими медицинского образования до прибытия врача.


- **Виды доврачебной помощи:**

- Измерение температуры, давления, уровня сахара в крови.
- Постановка горчичников, банок и компрессов.
- Первая помощь при травмах. Обработка ран.

- **Температура тела** — это показатель теплового состояния организма человека

- **Измерение температуры тела** —

это первое что мы делаем, когда чувствуем, что нам нездоровится.




Запись в тетрадь

- В давние времена люди судили о температуре тела наощупь: горячо, тепло или холодно.
- Однако точное определение температуры требует, чтобы температура измерялась объективно, с помощью приборов.
- Такие приборы называются **термометрами**
- Для измерения температуры тела используют медицинский термометр - **градусник**




Есть температура или нет?

- Идея прибора принадлежит итальянскому учёному Галилею. В 1597 году **Галилео Галилей** создал первый прибор для наблюдений за изменениями температуры, назвав его **термоскопом**.
- Термоскоп представлял собой небольшой стеклянный шарик с припаянной стеклянной трубкой. Шарик нагревали, а конец трубки опускали в воду. Когда шарик охлаждался, вода в трубке поднималась на определенную высоту вверх. При потеплении уровень воды в трубке опускался вниз. Недостатком прибора было то, что у него не было шкалы .



Из истории термометра



Габриэль Фаренгейт –
немецкий учёный




Андерс Цельсий –
шведский астроном

Создатели шкалы

Температурные шкалы

- Средства измерения температуры обычно проградуированы по относительным шкалам — Цельсия **С** или Фаренгейта **F**.
- В Англии и, в особенности, в США используется шкала Фаренгейта. Ноль градусов Цельсия — это 32 градуса Фаренгейта, а 100 градусов Цельсия — 212 градусов Фаренгейта.
- В России используется шкала Цельсия **С**





1

2



3

www.opt-union.ru

**Градусник
ртутный (1),
электронный (2),
термополоски (3),
инфракрасный (4).**



4




Виды медицинских термометров


- Шкала градусника начинается с **34°C** градусов и заканчивается **42°C** градусами. Границей нормальной температуры является **37°C** градусов .
- Пониженная температура – от **34°C** до **35,5°C**
- Нормальная температура тела – от **35,6°C** до **36,9°C**
- Повышенная температура – от **37°C** до **42°C**:
- Не высокая – от **37,1°C** до **37,9°C**
- Высокая – от **38,0°C** до **39,5°C**
- Очень высокая от **39,6°C** до **42,0°C**



Определение температуры по шкале



• Если температура нормальная –



• Если температура не высокая –



• Если температура высокая – срочно




Скорая помощь




Для вызова с мобильного телефона набери

103






?



Определи температуру

- На человеческом теле существует несколько мест, в которых принято измерять температуру (в подмышечной впадине, под языком, на локтевом сгибе, в прямой кишке, в ухе).




Способы измерения

Последовательность измерения температуры тела:

- - Приготовить всё необходимое и настроить себя или близкого человека.
- - Лечь удобно. У больного любого возраста измерение температуры проводится в состоянии покоя. - Достать термометр из футляра, встряхнуть его так, чтобы ртутный столбик опустился ниже 35 °С.
- - Вытереть насухо кожу в подмышечной впадине салфеткой. Влага изменяет показания термометра, так как охлаждает ртуть.
- - Поместить термометр ртутным резервуаром (ртутный столбик) в подмышечную впадину так, чтобы он со всех сторон соприкасался с кожей. Термометр не должен упираться в одежду.
- - Фиксировать руку, прижав её к грудной клетке.
- - Измерять температуру 7-10 минут.
- - Во время измерения нужно находиться без движений, не разговаривать, не петь, не кушать, не пить. **Нежелательно ходить с градусником по квартире!**
- - Если измеряете 2 раза в сутки: утром и вечером, занесите показания в температурный лист.
- - После измерения температуры желательно промыть градусник мыльной водой или протереть спиртовой салфеткой, вытереть насухо.

Практическая работа



**Опасность разбитого
градусника – РТУТЬ!**



- 1. Набрать номер **03, 103**.
- 2. Поздороваться.
- 3. Указать причину, по которой звонишь:
У ребёнка высокая температура, жалобы на: плач, рвота, понос.
- 4. Назвать: фамилию, имя больного, сколько лет, домашний адрес (*дом или корпус, подъезд, код, этаж, квартиру*).
- 5. Поблагодарить, попрощаться.



Порядок вызова скорой помощи

- - Самое распространённое место постановки термометра? (в ухе, в подмышечной впадине, в ротовой полости)
- - Каким из этих термометров вы воспользуетесь для измерения температуры тела? (медицинский, уличный, комнатный, водный)
- - Сколько минут нужно измерять температуру тела человека ртутным термометром? (10, 5, 15 минут)
- - К какому виду помощи относится измерение температуры? (врачебная, доврачебная, никакая)

Закрепление