Профилактика суицидального риска в образовательном учреждении

Педагог-психолог Какоткина Т. О.

У молодых самоубийство — мольба о помощи. У стариков — только мольба о смерти.

Антоний Кэмпиньский



Самоубийство, суицид (от лат. sui caedere – убивать себя) – преднамеренное лишение себя жизни, как правило, самостоятельное и добровольное.



Факторы суицидального риска

Особенности семей:

- Самоубийства и суицидальные попытки в семье;
- Психические расстройства у родителей;
- Развод, уход из семьи, смерть;
- Злоупотребление алкоголем, наркомания;
- Насилие в семье;
- Недостаток внимания;
- Конфликтные отношения;
- Ожидания со стороны родителей;
- Ссоры;
- Агрессивность;
- Смена места жительства;
- Недостаток времени.

Психотравмирующие события:

- Обидные, оскорбительные ситуации;
- Неприятности в семье;
- Смерть значимого человека;
- Разрыв отношений;
- Разлука;
- Конфликты;
- Межличностные конфликты;
- Суицидальная попытка;
- Проблемы с законом;
- Разочарование;
- Требования педагогов;
- Материальное положение;
- Нежелательная беременность;
- ВИЧ-инфекция.

Особенности личности:

- Нестабильность настроения;
- Агрессивное поведение;
- Склонность к демонстративному поведению;
- Чрезмерная импульсивность;
- Неспособность преодоления проблем;
- Чувство разочарования;
- Тревога и подавленность;
- Излишняя самоуверенность;
- Чувство неполноценности и неуверенности;
- Сексуальная ориентация;
- Сложность отношений.

Индикаторы суицидального риска

Ситуационные индикаторы суицидального риска:

- Смерть любимого человека;
- Расставание с любимым человеком;
- Вынужденная социальная изоляция, особенно от друзей или от семьи (переезд на новое место жительства);
- Сексуальное насилие;
- Нежелательная беременность;
- Позор, унижение «потеря лица».

Поведенческие индикаторы суицидального риска:

- Злоупотребление психоактивными веществами, алкоголем;
- Эскейп-реакции (уход из дома и т.п.);
- Изменение привычек, например, несоблюдение правил личной гигиены, ухода за внешностью;
- Предпочтение тем разговора и чтения, связанных со смертью или самоубийствами;
- «Приведение дел в порядок» (письма к родственникам и друзьям, раздаривание личных вещей).

Коммуникативные индикаторы суицидального риска:

- Разрешающие установки к суицидальному поведению;
- Негативная триада, характерная для депрессивных состояний;
- «Туннельное поведение» ;
- Наличие суицидальных мыслей, намерений, планов;
- Импульсивность;
- Доступность средств суицида (фармакологические препараты и т.п.).

Когнитивные индикаторы:

- Разрешающие установки относительно суицидального поведения;
- Негативные оценки личности;
- Представление о своей личности как о ничтожной;
- Представление о мире как месте потерь и разочарований;
- Представление о будущем как бесперспективном, надежном;
- Наличие суицидальных мыслей, намерений, планов.

Эмоциональные индикаторы суицидального риска:

- Депрессивное настроение;
- Переживание горя.



ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ БЛИЗКОМУ ИЗБЕЖАТЬ

СУИЦИДА



Помощь при потенциальном суициде

ВАЖНО!!!

- Сохранять спокойствие;
- не осуждать;
- не бояться задавать вопросы;
- поощрять полную откровенность;
- больше слушать, чем говорить;
- сконцентрировать на «здесь и сейчас»;
- дать понять, что требуется общение, поддержка и понимание;
- донести до родителя о необходимости консультации врача-психиатра.

Рекомендации по ведению беседы

- Выразите свою заинтересованность личностью собеседника.
- Задавайте вопросы прямо.
- Выяснить образ будущего суицидального действия.
- Выяснить причины суицидального намерения.
- Побудить выразить чувства.

Алгоритм взаимодействия специалистов органов и

- 1. Педагоги, социальные педагоги образовательных учреждений при выявлении суицидальных высказываний или попыток у несовершеннолетних:
- 1.1. Организуют консультацию н/л у психолога образовательного учреждения, в случае отсутствия психолога у специалиста-психолога в УСПН в трехдневный срок.
- 1.2. Организуют консультацию врача-психиатра Таштыпской РБ в трехдневный срок (в случае отказа н/л или его законных представителей берут письменный отказ).
- 1.3.Информируют КДНиЗП о выявленных фактах суицидальных высказываний или попыток у н/л, с предоставлением характеризующего материала на н/л и заключений психолога, врача-психиатра в десятидневный срок.

- 1.4. Психологам образовательных учреждений, психологу УСПН предоставлять в КДНиЗП справку по случаям выявления суицидальных высказываний или попыток у н/л ежеквартально.
- 1.5. ОВД по Таштыпскому району предоставлять в КДНиЗП сведения о случаях суицидов н/л ежеквартально.
- 1.6. КДНиЗП анализировать ситуацию по совершению суицидов н/л ежеквартально.

Тот, кто ответил себе на вопрос «Зачем жить?», сможет вытерпеть почти любой ответ на вопрос «Как жить?».



ФРИДРИХ НИЦШЕ