

Детский центральный паралич (ДЦП)

**Автор: Зыкова О.С., учитель
коррекционных классов МБОУ СШ
№2**

Что такое ДЦП?

ДЦП – это название целой группы неврологических нарушений, которые возникают в результате поражения структур мозга у ребенка во время беременности и в первые недели жизни. Обязательным клиническим компонентом являются двигательные нарушения, кроме которых зачастую имеются речевые и умственные расстройства, эпилептические припадки и нарушения эмоционально-волевой сферы. ДЦП не имеет прогрессирующего характера, однако его симптомы часто остаются с человеком на всю жизнь и становятся причиной инвалидности.



Причины ЛЦП

Нарушение
развития структур
головного мозга

Нехватка
кислорода

Токсическое
воздействие на
ребенка

Перенесенные
внутриутробно и в
первые месяцы
жизни
инфекционные
заболевания

Хронические
заболевания
матери

Несовместимость
матери и плода по
различным
причинам

Механические
травмы



Симптом

НПринято выделять несколько стадий заболевания:

Раннюю – до 5 месяцев жизни

Задержка двигательного развития.
Существование безусловных рефлексов , которые к определенным годам должны угасать- признак патологии.
Нарушение мышечного тонуса.
Преимущественное использование одной конечности для осуществления действий.

Начальную резидуальную – с 6 месяцев и до 3 лет;


Нарушения движений и мышечного тонуса, речи, умственного развития, слуха и зрения, глотания, мочеиспускания и дефекации, формирование контрактур и скелетных деформаций, судороги.

Позднюю резидуальную – после 3-х лет

Патологические отклонения в двигательных, речевых и интеллектуальных сферах стабилизируются, формируются органические контрактуры и деформация суставов.

Классификация

ДЦП



1. Спастическая диплегия

Для нее характерны двигательные нарушения верхних и нижних конечностей, причем больше поражаются ноги.

2. Двойная гемиплегия – самая тяжелая форма **ДЦП**. Она характеризуется двигательными нарушениями во всех конечностях, при этом в руках больше, чем в ногах (реже руки и ноги поражены в равной степени).



3. Спастическая гемиплегия характеризуется двигательными нарушениями преимущественно на одной стороне.

Классификация ДЦП



4. Гиперкинетическая форма ДЦП характеризуется преимущественным поражением структур стриопаллидарной системы (подкорковых отделов мозга).

5. Атонически-астатическая форма ДЦП характеризуется мозжечковой дизартрией, патологическими синергиями, интенционным тремором.

6. Смешанная форма. Эта форма диагностируется при наличии симптомов, характерных для двух и более клинических форм.

Лечени

е


Лечение ДЦП – процесс сложный и очень длительный. Эффект зависит от тяжести поражения нервной системы, срока диагностики заболевания, комплексности методов лечения, упорства и настойчивости родителей больного ребенка.

Среди всех методов лечения следует отметить следующие:

- Массаж;
- Лечебная гимнастика;
- Войт-терапия, Бобат-терапия;
- Использование нагрузочных (тренировочных) костюмов – «Адели», «Гравистат» и других;
- Занятия с логопедом и психологом;
- Медикаментозное лечение;
- Оперативная ортопедическая помощь;
- Симптоматическое нейрохирургическое



ДЦП это не всегда




Американский актёр
Сильвестр Сталлоне




Актёр Ар-Джей
Митт



Анна
Макдональ
д.



Кристи
Брауна



Леонардо да
Винчи

Список использованной литературы

1. Астахов В.А. Детский церебральный паралич: понятие, этиология, симптомы // Здоровье – 2000 - №3 – С.14-15
2. Бровицкий А.С. Виды, симптомы, лечение ДЦП // Здоровье, 2000 - №2-С.15
3. Веселов А.В. Лечение ДЦП // Здоровье, 2000 - №12-С.21
4. Драгунов С.К. Лечебная физкультура и массаж при ДЦП // Здоровье – 2000 - №3 – С.32
5. Благотворительный телемарафон «Крылья». Знаменитые люди с диагнозом ДЦП: [Электронный ресурс]. 2002-2006г. URL: <http://123ru.net/mix/58225037> (Дата обращения: 29.10.17)