

КРАСНАЯ КНИГА

**Растения и грибы
Ставропольского края**

Полынь кавказская



На Ставрополье встречается на г. Машук, г. Горячей, в окрестностях г. Кисловодска, Растет на сухих каменистых склонах, преимущественно на известняках, травертинах и доломитах. Цветет в июне-июле.

Подснежник Воронова



Встречается в Ставропольском крае, близ города Ессентуки. Растет в нижнем и среднем горных поясах в лесах, среди кустарников, на опушках, предпочитает богатые, хорошо увлажненные почвы.

Безвременник яркий



Встречается в
Ставропольском крае,
на Ставропольской
возвышенности по
Калаусу, у
Минеральных Вод и
везде по уцелевшим
остаткам степей вдоль
речек, балок.

Клён светлый



На Ставрополье встречается в окрестностях г. Ессентуки – ст. Белый Уголь и в окрестностях ст. Бекешевской.

Цветет в апреле-мае, плоды распространяются ветром.

Тис ягодный



На территории Ставрополя известен из окрестностей г. Пятигорска и в окрестностях ст. Боргустанской, в урочище Широкое .
Растет в лесах, на горных склонах. Обладает медленным ростом, не позволяющим ему конкурировать с быстрорастущими древесными видами. Размножение семенное, семена распространяются птицами. Продолжительность жизни до 1500 лет.

Ястребинка ставропольская



Распространена на
Ставропольской
возвышенности.
Обитает на травянистых
луговых склонах.
Современное состояние
популяций неизвестно.
Размножение семенное,
зрелые семянки
образуются без
оплодотворения .

Шишкогриб хлопьеножковый



В крае отмечался в южных районах. Обитает в лиственных и смешанных лесах на почве, иногда на погребенных остатках разрушенной древесины. Встречается одиночно или небольшими группами в июне - октябре. Съедобен.

Грифола курчавая, гриб-баран



В Ставропольском крае отмечался в окрестностях г. Пятигорска .
Растет на почве, у основания старых деревьев дуба, каштана, граба, бука, в малопосещаемых широколиственных лесах. Встречается единичными экземплярами в июле - сентябре. Плодовые тела растут необычайно быстро - в течение 8-10 дней достигают массы 10 кг и более. Гриб не поражается насекомыми. Съедобен.

Лук медвежий (черемша)



В крае вид относительно редок, встречается в лесных массивах Ставропольской возвышенности, в лесах лакколитов и меловых хребтов КМВ

Растет в лесах, на влажных, богатых гумусом почвах, особенно часто встречается в оврагах в сообществе с папоротниками. Размножение семенное и вегетативное.