



КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

**МАДОУ детский сад
«Солнышко»
С.Янгельское
Старший
воспитатель
Янбердина М.А.**

ЖИВОТНЫЕ Красной книги Республики



НАСЕКОМОЯДНЫ Е ВЫХУХОЛЬ



Вухоль - необычный зверёк из отряда насекомоядных, обитающее близ водоемов, массой в полкилограмма. Шерсть у животного очень густая, жесткая, покрытая маслянистой жидкостью для увеличения водостойкости и лучшего скольжения в воде. Хвост у вухоли длинный и тонкий, покрыт жесткими роговыми чешуйками, а у основания расширяется. У зверька очень необычная мордочка: вытянутый нос-хоботок с рыльцем на конце. Вухоль практически полностью слепа, но ориентируется в пространстве за счет обоняния и осязания.

Места обитания

Вухоль обитает на территории Центральной России, и ее естественный ареал распространения ограничен бассейнами рек Дон, Днепр, Волга и Урал.

УШАСТЫЙ ЁЖ -обитает в Европе, Центральной и Средней Азии, на Кавказе, в Южной Америке. Встретить его можно в пустынях и полупустынях, в степях, но **обязательно неподалёку от источника воды.**


Внешний вид

Этот зверек весит от 200 до 500 г, длина его тела 14 – 27 см. Ушки, длиной до 5 см очень подвижны и отменно все слышат. Глаза хорошо видят, а чутьё не подводит. Иголки растут только на спине, а бока и брюшко покрыты густым мягким и коротким мехом. Мордочка животного заостренная. Питается в основном насекомыми, чаще всего это жуки и муравьи, личинками. Может исхитриться и поймать змею, ящерицу или лягушку. Поедает ягоды и семена.



Байбак – степной сурок — грызун рода сурков.

Байбак является одним из самых крупных беличьих: длина его тела 50—70 см, масса самцов достигает 10 кг. Тело у байбака толстое, на коротких, сильных лапах, вооружённых крупными когтями. Голова



ощённая шея короткая.

За Уралом и на Северном Казахстане его ареал менее фрагментирован; здесь байбак встречается от реки Урал до Иртыша. Байбак — природный обитатель равнинных злаково-разнотравных степей. В случае распашки степи сурки вскоре уходят на ближайшую целину или в крайнем случае на «неудобья»: залежи, нераспаханные склоны оврагов, балок, речных долин, межи, выгоны и даже на обочины просёлочных дорог. Пригодные для обитания байбака участки сейчас составляют незначительную долю пахотных земель. Обитание на посевах зерновых и овощей для него нехарактерно; в таких местах байбак селится вынужденно и временно. На более длительные сроки задерживается на посевах многолетних трав. Умеренный выпас скота и близкое соседство человека на него не влияют.

Обыкновенная летяга - относятся к семейству беличьих, подсемейство грызунов. В лесах России обитает обыкновенная летяга. Обыкновенную летягу называют «летучей белкой». Необычное строение тела позволяет зверьку не только перелетать с одного дерева на другое, но и производить сложные акробатические движения: планировать, выполнять в воздухе сложные маневры и фигуры высшего пилотажа, иногда приземляясь в том же месте, откуда произошел старт.

Длина животного от 12 до 23 см, вес – около 170 г. На округлой тупоносой голове располагаются короткие уши без кисточек и большие выпуклые черные глаза. Густой шелковистый мех сверху тела серебристо-серый, нередко с бурым оттенком, на брюшке белый с желтизной. Главное, что отличает летягу от белки – наличие кожной перепонки, расположенной между задними и передними конечностями. Хвост используется для стабилизации в полете и играет роль тормоза при посадке на дерево.

Образ жизни белки-летяги Средой обитания белок-летяг являются леса смешанные и лиственные, реже – хвойные. В основном они ведут ночной и сумеречный образ жизни.

Активность летяги проявляют круглый год, лишь в морозные дни отсиживаются в гнезде, питаясь заготовленными впрок запасами. Большую часть жизни проводят на деревьях, редко опускаясь на землю. Гнезда строят в уже готовых дуплах, оставшихся от дятлов, сорок и белок. Иногда случается, что летяги селятся в скворечниках.



Большой тушканчик – это млекопитающее, которое относится к отряду грызунов, как мыши или зайцы. Они обитают практически во всех широтах, как в степях, так и в арктических широтах, нередко встречается тушканчик в



тыне. У них достаточно длинный, для размера их туловища, хвост, от семи до тридцати с лишним сантиметров. На кончике хвоста у них имеется плоская кисточка, выполняющая при быстром беге функции хвостового руля. Голова тушканчика, обычно, крупная, на фоне ее, практически, не заметна шея животного. Форма мордочки приплюснутая, а уши довольно большие и закругленные. Туловище покрыто густым и очень мягким мехом, чаще всего бежевого или светло-коричневого цвета. Тушканчик в дикой среде обитания зимой впадает спячку, приблизительно в конце сентября и до активного снеготаяния в марте. Тушканчик - это ночной зверь.

Пищуха степная относится к отряду зайцеобразные. Обитает животное в степных, лесостепных и полупустынных зонах.

Предпочтение отдаётся участкам с высокой травой и кустарниками.

Ареал распространения сравнительно небольшой. Он охватывает

земли юга России и Северного Казахстана от Волги до Монголии.

Животное это nocturnal, живёт в стае, роет норы. Они имеют сложную систему ходов со многими выходами.

Данный вид подразделяется на 2 подвида – европейский и азиатский. Первый подвид живёт в западной части ареала до Урала, а второй подвид населяет Казахстан и азиатские районы России. Живут зверьки стаями или семьями. При этом у каждой семьи имеется свой участок, который охраняется от чужаков.

Семейство роет целую сеть подземных ходов. Норы подразделяются на временные и постоянные.

Временные служат для быстрого спасения от хищников. В постоянных имеются гнездовые камеры. Они выстилаются травой и листьями. Выходы из таких нор обычно делаются в хорошо замаскированных камнями или кустами местах. Рацион питания состоит из растительной пищи. Это трава, листья, молодые побеги, семена и плоды.



Выдра - обитает на всех материках, кроме Австралии. Они живут везде, где есть ручья, реки и озера, с которыми тесно связана жизнь этих животных. Они предпочитают водоемы с несильным течением. Живут в норах или пещерах возле

ВОДЫ.

Выдры могут жить только в чистых водоемах.

Поэтому загрязнение сильно сократило численность вида. Выдры считаются замечательными охотниками. Тело имеет все приспособления для охоты в воде. Между лапами перепонки, а мех препятствует потере тепла. Основной добычей выдр является рыба, лягушки, крабы, раки. В основном выдра ведет ночной образ жизни, но могут появляться и днем. Могут охотиться и для развлечения: сначала ловят рыбу, потом отпускают. Выдры приносят большую пользу рыбному хозяйству. Они съедают непромысловую рыбу, которая питается икрой и мальками.



Европейская норка – представитель семейства куньих, своим внешним видом напоминает колонка и хорька. Ареал распространения этого хищника практически весь сосредоточен в европейской части России. За Уральскими горами она встречается лишь по притокам р.

Оби.
Норка небольшой зверек с блестящим мехом. Тело сильно вытянутое, слегка приплюснутое сверху. Лапы короткие. Морда тупоносая, уши небольшие, голова сверху уплощенная. Пальцы на лапах соединены плавательными перепонками. Хвост достигает 1/3 длины тела. Европейская норка ведет уединенный и территориальный образ жизни. В теплые месяцы живет на постоянном участке. В зимнее время часто передвигается в поисках пищи вдоль берегов рек. Норка не боится воды, она отлично умеет плавать и нырять. Ловкая проворная хищница, хорошая охотница.



Марал – парнокопытное животное. Самый крупный среди представителей рода. Ареал проживания благородных оленей довольно широк. Этих величественных животных можно встретить почти по всей Европе.



Живут олени небольшими стадами, вожаком которых становятся самые старые самки. Самцы держатся отстраненно, чаще всего они «гуляют сами по себе».

Места обитания и образ жизни. Тяготеет к светлохвойным насаждениям в пересеченном рельефе; широколиственных лесов избегает. Предпочитает травянистые корма. Зимой пасется как в горно-степных участках, так и в пойме, в сосновых и смешанных лесах с эпифитными лишайниками.