

*Государственное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №35  
с углубленным изучением английского языка  
Василеостровского Административного района Санкт-Петербурга*

## ***Урок алгебры в 8 классе***

### ***«Квадратные уравнения. Способы их решения»***

*учитель Гладких Н.М.*

# Тема: РЕШЕНИЕ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ.

- Проверим знания определений, формул и формулировок правил, которые необходимо знать для успешного усвоения темы и умений решать квадратные уравнения.*
- Вспомним все ранее изученные способы решения квадратных уравнений.*
- Изучим новое свойство квадратных уравнений, которое позволит устно находить корни квадратного уравнения.*

*Три пути ведут к знанию:  
Путь размышления – это путь  
Самый благородный,  
Путь подражания – это путь  
Самый легкий  
И путь опыта – это путь  
Самый горький.*

*Конфуций*

*Уравнения записаны по какому-то определенному признаку. Как вы думаете, какое из уравнений этой группы лишнее?*

$$1) 2x^2 - x = 0;$$

$$2) x^2 - 16 = 0;$$

$$3) 5x^2 - 8x + 3 = 0;$$

$$4) 2x^2 = 0;$$

$$5) x^2 - 5x = 0,$$

*По формуле корней полного квадратного уравнения*

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

*Вычислите корни квадратного уравнения*

$$5x^2 - 8x + 3 = 0; \quad a = 5, b = -8, c = 3;$$

$$D = 64 - 4 \cdot 5 \cdot 3 = 4,$$

$$x_1 = \frac{8 + 2}{10} = 1, \quad x_2 = \frac{8 - 2}{10} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

$$\text{Ответ : } x = 1, x = \frac{3}{5}.$$

*По формуле*

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

*Вычислите корни квадратного уравнения*

$$7x^2 - 9x + 2 = 0; \quad a = 7, b = -9, c = 2;$$

$$D = 81 - 4 \cdot 7 \cdot 2 = 25,$$

$$x_1 = \frac{9 + 5}{14} = 1, \quad x_2 = \frac{9 - 5}{14} = \frac{2}{7}.$$

*Ответ* :  $x = 1, x = \frac{2}{7}.$

*Уравнения записаны по какому-то определенному признаку. Как вы думаете, какое из уравнений этой группы лишнее?*

$$1) x^2 - 5x + 1 = 0;$$

$$2) 9x^2 - 6x + 10 = 0;$$

$$3) x^2 + 2x - 2 = 0;$$

$$4) x^2 - 3x - 1 = 0;$$

$$5) x^2 - 5x + 17 = 0,$$

*По формуле корней  
приведенного квадратного уравнения*

$$x^2 + px + q = 0$$

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

*Р со знаком взяв обратным,*

*На два мы его разделим.*

*И от корня аккуратно*

*Знаком минус, плюс отделим.*

*А под корнем, очень кстати,  
Половина р в квадрате,  
минус q – и вот решенья  
небольшого уравнения.*



*Методом выделения полного квадрата*

$$x^2 + px + q = 0$$

*Вычислите корни квадратного уравнения  
методом выделения полного квадрата*

$$x^2 + 6x - 7 = 0$$

$$x^2 + 6x + 9 = 9 + 7$$

$$(x + 3)^2 = 16,$$

$$x + 3 = 4, \quad x + 3 = -4,$$

$$x = 1, \quad x = -7,$$

*Ответ :  $x = -7, x = 1.$*

*Вычислите корни квадратного уравнения методом выделения полного квадрата*

$$x^2 - 4x - 5 = 0,$$

$$x^2 - 4x + 4 = 4 + 5,$$

$$(x - 2)^2 = 9,$$

$$x - 2 = 3, \quad x - 2 = -3,$$

$$x = 5, \quad x = -1,$$

*Ответ :  $x = -1, x = 5$ .*

*Вычислите корни квадратного уравнения методом выделения полного квадрата*

$$x^2 + 2x - 3 = 0,$$

$$x^2 + 2x + 1 = 1 + 3,$$

$$(x + 1)^2 = 4,$$

$$x + 1 = 2, \quad x + 1 = -2,$$

$$x = 1, \quad x = -3,$$

*Ответ :  $x = 1, x = -3$ .*

*Вычислите корни квадратного уравнения методом выделения полного квадрата*

$$x^2 + 2x - 3 = 0,$$

$$x^2 + 2x + 1 = 1 + 3,$$

$$(x + 1)^2 = 4,$$

$$x + 1 = 2, \quad x + 1 = -2,$$

$$x = 1, \quad x = -3,$$

*Ответ :  $x = 1, x = -3$ .*

*По теореме, обратной теореме Виета.*

*Если числа  $p, q, x_1, x_2$  таковы, что*

$$x_1 + x_2 = -p, \quad x_1 \cdot x_2 = q,$$

*то  $x_1$  и  $x_2$  - корни уравнения  $x^2 + px + q = 0$ .*

*По теореме, обратной теореме Виета.*

$$ax^2 + bx + c = 0 \mid : a \quad x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0.$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}, \quad x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}.$$

*По праву в стихах быть воспета*

*О свойствах корней теорема Виета.*

*Что лучше, скажи, постоянства такого:*

*Умножишь ты корни – дробь уж готова:*

*В числителе **c**, в знаменателе **a**,*

*А сумма корней тоже дроби равна.*

*Хоть с минусом дробь эта, что за беда –*

*В числителе **b**, в знаменателе **a**.*

*Решите приведенные квадратные уравнения по теореме, обратной теореме Виета*

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_1 + x_2 = -1$$

$$x_1 = 1,$$

$$x_1 \cdot x_2 = -2$$

$$x_2 = -2.$$

*Ответ :  $x = 1, x = -2.$*

*Решите приведенные квадратные уравнения по теореме, обратной теореме Виета*

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$x_1 + x_2 = 3 \quad x_1 = 1,$$

$$x_1 \cdot x_2 = 2 \quad x_2 = 2.$$

*Ответ :  $x = 1, x = 2.$*



*Решите приведенные квадратные уравнения по теореме, обратной теореме Виета*

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$x_1 + x_2 = 3 \quad x_1 = 1,$$

$$x_1 \cdot x_2 = 2 \quad x_2 = 2.$$

*Ответ :  $x = 1, x = 2.$*

**Дано**

**уравнение:**

$$x^2 - 6x + 5 = 0$$

Не решая уравнения, найти:

1) сумму корней  $x_1 + x_2 = 6$

2) произведение

$$x_1 \cdot x_2 = 5$$

3) квадрат суммы

$$(x_1 + x_2)^2 = 36$$

4) удвоенное произведение

$$2x_1 \cdot x_2 = 10$$

5) сумму чисел обратных

корням

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$$

*При решении некоторых квадратных уравнений, оказывается, немаловажную роль играет сумма коэффициентов*

$$x^2 + x - 2 = 0, \quad \text{сумма коэффициентов}$$

$$\text{Ответ : } x = 1, x = -2.$$

$$x^2 + 2x - 3 = 0, \quad \text{сумма коэффициентов}$$

$$\text{Ответ : } x = 1, x = -3.$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0, \quad \text{сумма коэффициентов}$$

$$\text{Ответ : } x = 1, x = 2.$$

$$5x^2 - 8x + 3 = 0, \quad \text{сумма коэффициентов}$$

$$\text{Ответ : } x = 1, x = \frac{3}{5}.$$

*Запись этого свойства для решения  
квадратного уравнения имеет вид:*

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

*сумма коэффициентов*  $a + b + c = 0,$

$$x_1 = 1, x_2 = \frac{c}{a}.$$

*Для решения приведенного квадратного уравнения имеет вид:*

$$x^2 + bx + c = 0,$$

$$a + b + c = 0,$$

$$x_1 = 1, x_2 = c.$$

*Запись этого свойства для решения  
квадратного уравнения имеет вид:*

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

*сумма коэффициентов*  $a - b + c = 0,$

$$x_1 = -1, x_2 = -\frac{c}{a}.$$

*Для решения приведенного квадратного уравнения имеет вид:*

$$x^2 + bx + c = 0,$$

$$a - b + c = 0,$$

$$x_1 = -1, x_2 = -c.$$

*Это свойство применяют для устного решения квадратных уравнений.*

*Воспользуйтесь этим свойством и решите уравнения.*

*ВАРИАНТ I*

$$a) x^2 + 23x - 24 = 0,$$

$$б) 2x^2 + x - 3 = 0,$$

$$в) -5x^2 + 4,4x + 0,6 = 0,$$

$$г) \frac{1}{3}x^2 + 2\frac{2}{3}x - 3 = 0,$$

*ВАРИАНТ II*

$$a) x^2 + 15x - 16 = 0,$$

$$б) 5x^2 + x - 6 = 0,$$

$$в) -2x^2 + 1,7x + 0,3 = 0,$$

$$г) \frac{1}{4}x^2 + 3\frac{3}{4}x - 4 = 0,$$

*ВАРИАНТ I*

$$a) x^2 + 23x - 24 = 0,$$

$$1 + 23 - 24 = 0,$$

*Ответ* :  $x = 1, x = -24$ .

$$б) 2x^2 + x - 3 = 0,$$

$$2 + 1 - 3 = 0,$$

*Ответ* :  $x = 1, x = -1,5$ .

$$в) -5x^2 + 4,4x + 0,6 = 0,$$

$$-5 + 4,4 + 0,6 = 0,$$

*Ответ* :  $x = 1, x = -0,12$ .

$$г) \frac{1}{3}x^2 + 2\frac{2}{3}x - 3 = 0,$$

$$\frac{1}{3} + 2\frac{2}{3} - 3 = 0,$$

*Ответ* :  $x = 1, x = -9$ .

*ВАРИАНТ II*

$$a) x^2 + 15x - 16 = 0,$$

$$1 + 15 - 16 = 0,$$

*Ответ* :  $x = 1, x = -16$ .

$$б) 5x^2 + x - 6 = 0,$$

$$5 + 1 - 6 = 0,$$

*Ответ* :  $x = 1, x = -1,2$ .

$$в) -2x^2 + 1,7x + 0,3 = 0,$$

$$-2 + 1,7 + 0,3 = 0,$$

*Ответ* :  $x = 1, x = -0,15$ .

$$г) \frac{1}{4}x^2 + 3\frac{3}{4}x - 4 = 0,$$

$$\frac{1}{4} + 3\frac{3}{4} - 4 = 0,$$

*Ответ* :  $x = 1, x = -16$ .

## *Домашнее задание*

$$x^2 - x - 2 = 0,$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0,$$

$$5x^2 + 8x + 3 = 0,$$

$$x^2 + 3x + 2 = 0,$$



*Найдите еще свойство коэффициентов квадратного уравнения, позволяющее устно найти его корни.*



*Спасибо за  
урок!*



# Сведения из истории

*III до н.э. Древнегреческий ученый Евклид*

*– решение квадратных уравнений графически*

*XIII век Европа, Леонардо Пизанский*

*– формулы нахождения корней квадратного уравнения*

*XVI век Французский математик Франсуа Виет*

*– вывод формулы корней квадратного уравнения в общем виде*

*XVI век Германия, Штифель (священник и математик)*

*– систематическое употребление термина «корень уравнения»*

*XIX век Ирландский, ученый – математик Гамильтон*

*- ввел термин дискриминант*