

**ИСЧЕЗАЮЩИЕ
ВИДЫ ЖИВОТНЫХ
КРАСНОДАОГО
КРАЯ.**



ВЫДРА КАВКАЗСКАЯ.

ВЫДРА КАВКАЗСКАЯ.

- Кавказская выдра предпочитает предгорные и горные реки с быстрым течением, лесистыми берегами и обилием основного корма - рыбы (форели). Активна в сумеречно-ночное время. Для жилья выбирает пресные водоемы. Норы устраивает в корнях деревьев, под корягами. Вход в норы скрыт под водой. К основным факторам исчезновения выдры на Кавказе можно отнести ухудшение водосбросов, уменьшение количества рыбы вследствие загрязнения водоемов, браконьерство, сведение древесной и кустарниковой растительности по берегам рек.



ЗУБР.

ЗУБР.

- Кавказский зубр отличался от других видов тем, что был меньшего размера. Узкий, с плоским черепом. Хвост кисточкой и короткий кудрявый мех - все что нужно для выживания в горах. Грива у животного была не длинее 25 см.
- Кавказский зубр исконный обитатель лесов Кавказа. Зубров можно было встретить в горных районах Северного Кавказа от реки Пшиш на западе, до реки Терек на Востоке, а также между реками Ингури на Юге и рекой Кубань.



БЕРКУТ.

БЕРКУТ.

Очень крупный и сильный орёл — длина тела 76—93 см, размах крыльев 180—240 см. Клюв орлиный, крючкообразно загнут вниз. Крылья длинные и широкие. Хвост слегка закруглённый и более длинный, чем у других орлов.

- Охотится на разнообразную дичь, в том числе и крупную. Нередко в рационе сурки, суслики, зайцы, хорьки, черепахи. Иногда нападает на животных, значительно большего его по весу и размерам, особенно больных или детёнышей — благородных оленей, косуль, серн, овец.



КАВКАЗСКИЙ ЛЕСНОЙ КОТ.

КАВКАЗСКИЙ ЛЕСНОЙ КОТ.

Заметно крупнее домашней кошки. Общий вес самцов - 3,1-6,08; самок - 3,0-6,0 кг.

Голова широкая и более округлая. Глаза большие. Зимний покров пышный и длинный. По лбу до затылочной области тянутся черные полосы. Общий тон окраски серый, иногда с рыжиной. На брюхе нередко имеются размытые черные пятна. По хвосту от 3 до 8 черных колец. Когти острые, что позволяет коту влезать на деревья.