


СИНДРОМЫ НЕВРОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ

(НЕВРОТИЧЕСКИЕ И НЕВРОЗОПОДОБНЫЕ).



Выполнила: Кузина М.Н

НЕВРОЗ

- Невроз - это функциональное расстройство высшей нервной деятельности, обусловленное воздействием психотравмирующего фактора, протекающее с эмоциональными и соматовегетативными нарушениями.

Для невроза характерно:

- Наличие психогенного этиологического фактора.
- Разнообразии и динамичности клиники.
- Обратимости симптоматики.
- Отсутствию патологоанатомического (морфологического, органического) субстрата.

ЭТИОЛОГИЯ НЕВРОЗОВ

- Основным этиологическим фактором является острая или хроническая психическая травма, однако имеют значение и предрасполагающие факторы:
 - **Пренатальные факторы:**
 - ❖ невротическое состояние матери, неблагоприятная обстановка в семье во время беременности;
 - ❖ наличие диэнцефального синдрома у матери;
 - ❖ перенесенная хроническая внутриутробная гипоксия.
 - **Интранатальные факторы:**
 - ❖ преждевременные или поздние роды;
 - ❖ дискоординация родовой деятельности;
 - ❖ гипоксия, асфиксия плода в родах.
 - **Конституциональногенетические факторы**
 - ❖ Психосоматические факторы:
 - ❖ черепно-мозговые травмы;
 - ❖ перенесенные нейроинфекции;
 - ❖ длительные соматические заболевания, а также любые другие астенизирующие факторы

ПАТОГЕНЕЗ НЕВРОЗОВ

- нарушение высшей нервной деятельности в результате напряжения и срыва процессов торможения,
- появления инертных застойных очагов возбуждения в коре и подкорковых образованиях,
- расстройства в системе гипоталамус - гипофиз - кора надпочечников,
- синдром дезорганизации - нарушение взаимоотношений в межполушарной системе, вегетативных отделах НС,
- изменение обмена адреналина, норадреналина, снижение содержания ДОФА в биологических жидкостях вследствие истощения симпатикоадреналовой системы (при хроническом стрессе).

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕВРОЗОВ I ГРУППА - ОБЩИЕ НЕВРОЗЫ

- неврастения;
- невроз навязчивых состояний;
- депрессивный невроз;
- истерия;
- ипохондрический невроз;
- нервная анорексия.

В клинической картине общих неврозов преобладают эмоциональные расстройства:

- ✓ Страх,
- ✓ Тревога,
- ✓ Раздражительность.

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕВРОЗОВ

II ГРУППА - СИСТЕМНЫЕ НЕВРОЗЫ

- **Заикание**
- Невротические ТИКИ
- Невротический ЭНурез
- Невротический ЭНкопрез

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕВРОЗОВ

НЕВРОЗЫ

III ГРУППА ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ НЕВРОЗЫ

патохарактерологические реакции;

-

нарушения поведения (реакции протеста, отказа, имитации).

-

НЕВРОЗ НАВЯЗЧИВЫХ СОСТОЯНИЙ

- Основными видами навязчивостей являются навязчивые движения и действия (обсессии), навязчивые страхи (фобии).
- В зависимости от преобладания клинической симптоматики выделяют:
 - 1. невроз навязчивых действий (обсессивный невроз)
 - 2. невроз навязчивых страхов (фобический невроз).

НЕВРОЗ НАВЯЗЧИВЫХ СОСТОЯНИЙ

- Возможны смешанные навязчивые состояния - обсессивно-фобический невроз.



НАВЯЗЧИВЫЕ СОСТОЯНИЯ (ОБСЕССИИ)

- Так называют разнообразные мысли, влечения, страхи, сомнения, представления, непроизвольно вторгающиеся в сознание больного, который прекрасно понимает всю их нелепость и в то же время не может с ними бороться.
- Обсессии как бы навязываются человеку, избавиться от них усилием воли он не может.
- Навязчивые мысли могут эпизодически появляться и у психически здоровых.
- Они часто связаны с переутомлением, иногда возникают после бессонной ночи и обычно носят характер навязчивых воспоминаний (какой-либо мелодии, строчки из стихотворения, числа, имени и т.д.).

НАВЯЗЧИВЫЕ СОСТОЯНИЯ (ОБСЕССИИ)

■ Навязчивые явления условно разделяются на 2 группы:

- **Отвлеченные**, или **аффективно-нейтральные**, т. е. протекающие без аффективных реакций навязчивости — навязчивый счет, бесплодное мудрствование, навязчивые действия;
 - **Образные**, или **чувственные навязчивости**, протекающие с выраженным аффектом — контрастные представления (навязчивые чувства антипатии к близким людям, навязчивые влечения), навязчивые сомнения, навязчивые страхи (фобии) и т.д.
- *Навязчивый счет* заключается в непреодолимом стремлении считать встречные машины определенного цвета, прохожих, светящиеся окна, собственные шаги и т.д.

НАВЯЗЧИВЫЕ СОМНЕНИЯ

- — крайне неприятное тягостное чувство, которое переживает пациент, сомневаясь в законченности того или иного действия. Так, врач, выписавший больному рецепт, длительное время не может избавиться от постоянно гложущего его сомнения в том, правильно ли он в рецепте указал дозу, не будет ли эта доза смертельной и т.д. Люди с навязчивыми сомнениями, уходя из дома, неоднократно возвращаются, чтобы проверить, выключен ли газ или свет, хорошо ли закрыт кран в ванной комнате, плотно ли закрыта дверь и т.д. Несмотря на многочисленные проверки напряженность сомнений не снижается.
- *Овладевающие представления* — это принятие неправдоподобного за действительность вопреки сознанию. На высоте развития овладевающих представлений критическое отношение к ним и осознание их болезненности исчезают, что сближает такие расстройства со сверхценными идеями или бредом.
- *Навязчивые страхи (фобии)* — мучительное и чрезвычайно интенсивное переживание чувства боязни тех или иных обстоятельств или явлений при критическом отношении и попытках бороться с этим чувством.

НЕВРОЗ НАВЯЗЧИВЫХ СТРАХОВ (ФОБИЧЕСКИЙ НЕВРОЗ).

- Этот невроз включает в себя ряд невротических состояний, при которых у больных возникают навязчивые страхи, мысли, действия, воспоминания, которые ими самими воспринимаются как чуждые и неприятные, болезненные; в то же время больные самостоятельно не могут освободиться от своих навязчивостей.
- В происхождении заболевания важную роль играет конституционально-личностная предрасположенность.
- Среди больных преобладают лица, склонные к рефлексии (самоанализу), а также тревожно-мнительные.

НЕВРОЗ НАВЯЗЧИВЫХ СТРАХОВ (ФОБИЧЕСКИЙ НЕВРОЗ).

- Чаще всего ведущей симптоматикой невроза являются страхи (фобии). Преобладает страх заболеть тяжелыми соматическими или инфекционными заболеваниями (кардиофобия, канцерофобия, сифилофобия, спидофобия и др.).
- У многих больных чувство страха вызывает пребывание в замкнутых пространствах, транспорте (клаустрофобия); они боятся выходить на улицу или находиться в людном месте (агорафобия); в некоторых случаях страх возникает тогда, когда больные только представляют себе эту трудную для них ситуацию.
- Невротики, при наличии фобических расстройств, стараются любым способом избавиться от тех ситуаций, в которых у них появляются страхи.
- Многие из них постоянно обращаются к различным врачам, чтобы убедиться в отсутствии заболеваний сердца (при кардиофобии), онкологического заболевания (канцерофобия). Пристальное внимание к работе своих внутренних органов способствует формированию ипохондрического расстройства.
- Иногда неврозы развиваются в связи с нарушением какой-либо привычной деятельности, при этом больные находятся в состоянии ожидания неудачи ее выполнения. Типичным примером может служить возникновение психогенного ослабления адекватных эрекции у мужчин, что в дальнейшем приводит к фиксации внимания на возможном «срыве» при необходимости сближения с женщиной и формированию «невроза ожидания» (Э. Крепелин, 1910).

НЕВРОЗ НАВЯЗЧИВЫХ СТРАХОВ (ФОБИЧЕСКИЙ НЕВРОЗ).


- Кроме подобных расстройств, могут возникать навязчивые действия (компульсии), например навязчивое мытье рук для достижения их идеальной чистоты (до 100 раз и более в сутки), возвращения домой для проверки закрыта ли дверь, выключен ли газ, утюг.
- В ряде случаев возникают навязчивые действия (ритуалы) с целью устранения навязчивости. Например, больной должен 6 раз подпрыгнуть и только после этого он может выйти из дома, так как спокоен и знает, что ничего плохого сегодня с ним не случится, и др.
- В динамике невроза навязчивых состояний (Н. М. Асатиани) выделяют три стадии.
- На первой стадии навязчивый страх возникает только в ситуации, когда больной боится чего-либо, на второй — при мысли оказаться в подобной ситуации, на третьей — условно-патогенным раздражителем является слово, каким-то образом связанное с фобией (например, при кардиофобии такими словами могут быть «сердце», «сосуды», «инфаркт»; при канцерофобии — «опухоль», «рак» и т. д.).

НЕВРОЗ НАВЯЗЧИВЫХ СТРАХОВ (ФОБИЧЕСКИЙ НЕВРОЗ).

- У некоторых больных наблюдаются «панические атаки» — повторяющиеся приступы резкого страха, чаще всего страха смерти, или потери сознания, которые сопровождаются сердцебиением, одышкой, болевыми ощущениями.
- Эти состояния могут быть достаточно продолжительными по времени, больные впоследствии опасаются их повторного возникновения, не выходят одни на улицу или передвигаются с сопровождающими.
- Большая часть таких вегетативных пароксизмальных приступов с сердцебиением и одышкой тесно связаны с хроническим стрессом и возникают на фоне переутомления.
- В отечественной психиатрии подобные состояния описывались как симпатoadреналовые кризы или обозначались как диэнцефальный синдром.
- Течение невроза навязчивости чаще всего затягивается на длительное время, происходит формирование невротического развития личности.

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОБИЙ


- 1. селахофобия – боязнь акул
- 2. нософобия – боязнь болезней
- 3. алгофобия – боязнь боли
- 4. ятрофобия – боязнь врачей
- 5. акрофобия – боязнь высоты
- 6. глоссофобия – боязнь выступления на публике
- 7. бронттофобия – боязнь грома
- 8. рипофобия – боязнь грязи
- 9. клаустрофобия – боязнь замкнутого пространства
- 10. эйсоптрофобия – боязнь зеркала
- 11. офидиофобия – боязнь змей
- 12. дентофобия – боязнь зубных врачей
- 13. фелинофобия – боязнь кошек
- 14. гематофобия – боязнь крови
- 15. родентофобия – боязнь крыс
- 16. веспертилиофобия – боязнь летучих мышей
- 17. ранидафобия – боязнь лягушек
- 18. спермофобия – боязнь микробов
- 19. кераунофобия – боязнь молний
- 20. гефиорофобия – боязнь мостов
- 21. мониторофобия – боязнь наблюдения
- 22. энтомофобия – боязнь насекомых
- 23. катагелофобия – боязнь насмешек
- 24. социофобия – боязнь неловкого поведения
- 25. атихифобия – боязнь неудачи



92738226

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОБИЙ

- 26. социофобия – боязнь общества
- 27. агорафобия – боязнь общественных мест
- 28. гоплофобия – боязнь огнестрельного оружия
- 29. пиробия – боязнь огня
- 30. эремофобия – боязнь одиночества
- 31. айхмофобия – острых предметов
- 32. реектофобия – боязнь отказа
- 33. арахнофобия – боязнь пауков
- 34. скелерофобия – боязнь плохих людей
- 35. авиафобия – боязнь полетов
- 36. полициофобия – боязнь полиции
- 37. карциноматофобия – боязнь рака
- 38. эметофобия – боязнь рвоты
- 39. герпетофобия – боязнь рептилий
- 40. танатофобия – боязнь смерти
- 41. канинофобия – боязнь собак
- 42. азтатемофобия – боязнь старения
- 43. ахлуофобия – боязнь темноты
- 44. терророфобия – боязнь терроризма
- 45. охлофобия – боязнь толпы
- 46. некрофобия – боязнь трупов
- 47. пнигофобия – боязнь удушения
- 48. трипанофобия – боязнь укулов
- 49. аквафобия – боязнь утопления
- 50. дисморфофобия – боязнь физических недостатков



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. А.О.Бухановский, Ю.А.Кутявин, М.Е.Литвак - «Общая психопатология», 2003 г.
- 2. В. В. марилов - «Общая психопатология», 2002 г.
- 3. Асатиани М. М. «Психотерапия», 1913 г.
- 4. Асатиани Н. М. «Особенности клиники и течения невроза навязчивых состояний».

