

5. ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ

Дифференциалы высших порядков

$$df = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} dx_k$$

$$d^2 f = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial y_j \partial x_k} dx_k dx_j$$

$$d^m f = D^m f$$

$$D^m = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n \right)^m$$

5. ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ

5.7. Формула Тейлора для функций многих переменных

$$f(x) = \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} d^k f(x^0) + \frac{1}{(m+1)!} d^{m+1} f(x^\theta)$$

5.8. Экстремумы функций многих переменных. Необходимые условия

Определение. Пусть $u=f(x)$ определена в окрестности точки x^0 . Локальный максимум в точке x^0 : Для некоторой окрестности $U(x^0)$ выполнено $\forall x \in U(x^0) : f(x) \leq f(x^0)$.

Строгий локальный максимум в точке x^0 : Для некоторой окрестности $U(x^0)$ выполнено $\forall x \in U(x^0), x \neq x^0 : f(x) < f(x^0)$.

Теорема (необходимое условие экстремума). Если функция $f(x)$ определена в окрестности точки x^0 , имеет в этой точке частные производные первого порядка и x^0 экстремум, то все частные производные равны нулю в этой точке.

Определение. Точка, в которой все частные производные первого порядка равны нулю, называется стационарной точкой функции.

Замечание 1. Стационарность точки x^0 эквивалентна условию $df(x^0)=0$.

Замечание 2. Глобальные максимумы или глобальные минимумы функции надо искать среди

1. стационарных точек,
2. точек, где не существуют частные производные первого порядка,
3. граничных точек.

5. ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ

5.9. Достаточные условия экстремума

Теорема. Если функция $f(x)$ определена в окрестности стационарной точки x^0 , имеет там непрерывные частные производные второго порядка, тогда если форма

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{kj}(t) \xi_k \xi_j$$

где $a_{kj} = \frac{\partial^2 f(x^t)}{\partial x_k \partial x_j}$, $x^t = x^0 + t \Delta x$, $\Delta x = x - x^0$, $\xi_k = \Delta x_k$

в точке x^0 положительно определена, то x^0 строгий локальный минимум, отрицательно определена, то x^0 строгий локальный максимум, знакопеременна, то x^0 не является экстремумом В остальных случаях ничего определенного сказать нельзя.

Пример 1. $z = x^2 + y^2 - 12x + 16y$

Пример 2. Найти \sup , \inf функции $z = x^2 - xy + y^2$, на множестве $|x| + |y| \leq 1$

5. ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ

Критерий Сильвестра

1. Для того чтобы квадратичная форма с симметричной матрицей являлась положительно определенной, необходимо и достаточно, чтобы все главные миноры матрицы были положительны, т. е. чтобы были справедливы неравенства $A_1 > 0, A_2 > 0, \dots, A_m > 0$.

2. Для того чтобы квадратичная форма с симметричной матрицей являлась отрицательно определенной, необходимо и достаточно, чтобы знаки главных миноров матрицы чередовались, причем знак A_1 был отрицателен, т. е. чтобы были справедливы неравенства

$$A_1 < 0, A_2 > 0, A_3 < 0, A_4 > 0, \dots$$

Пример.
$$u = \lambda x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_m^2 + 2x_2 + \dots + 2x_m,$$

6. ТЕОРИЯ НЕЯВНЫХ ФУНКЦИЙ

6.1. Понятие неявной функции . Теорема о существовании и дифференцируемости неявной функции и некоторые ее применения

Теорема. Пусть функция $F(u, x, y)$ дифференцируема в некоторой окрестности точки $M_0(u^0, x^0, y^0)$, причем частная производная $\frac{\partial F}{\partial u}$ - непрерывна в точке M_0 . Тогда, если в точке M_0 функция F обращается в нуль, а частная производная $\frac{\partial F}{\partial u}$ не обращается в нуль, то для любого достаточно малого положительного числа ε найдется такая окрестность точки $M_0(x^0, y^0)$, что в пределах этой окрестности существует единственная функция $u = \varphi(x, y)$, которая удовлетворяет условию $|u - u^0| < \varepsilon$ и является решением уравнения $F(u, x, y) = 0$, причем эта функция $u = \varphi(x, y)$ непрерывна и дифференцируема в указанной окрестности точки M_0 .

6. ТЕОРИЯ НЕЯВНЫХ ФУНКЦИЙ

