



**«ПРОФИЛАКТИКА АБОРТОВ КАК
КОМПЛЕКСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМА»**

Аборт и его виды



Аборт


В переводе с латинского означает «выкидыш».

Аборты бывают самопроизвольными и искусственными.

Самопроизвольные выкидыши происходят извне.

Искусственный аборт – медикаментозное или хирургическое вмешательство, с помощью которого производится прерывание беременности.



- 
- Мини-аборт – этот метод применяется до срока 4 недель беременности.
 - Классический аборт – применяется на сроке 18 – 27 недели.
 - Введения простогландинов – применяется на сроке до 27 недель
 - Операция малого кесарева сечения – применяется при сроке от 13 недель до самых последних дней беременности
 - Криминальный аборт

Осложнения искусственного прерывания беременности



Б. Заволоцкий 2010

Ранние осложнения:

- Выделения после аборта
- Перфорация матки
- Массивное кровотечение
- Неполный аборт
- Проникновение инфекции

Поздние осложнения:

- Нарушения менструального цикла
- Эндокринные нарушения
- Воспалительные заболевания
- Внематочная беременность
- Женское бесплодие

Методы профилактики искусственного прерывания беременности

К методам профилактики абортов относятся контрацепция и планирование семьи.



Работа по планированию семьи может осуществляться:

- Индивидуально;
- На уровне семьи;
- На уровне коллектива;
- Путем реализации соответствующих муниципальных и федеральных программ


Контрацепция


- Механическая;
- Физиологический метод;
- Внутриматочная контрацепция с применением внутриматочных спиралей;
- Гормональный метод;
- Прерванное половое сношение;
- Хирургические методы добровольной стерилизации мужчин и женщин;
- Метод лактационной аменореи;

Статистика аборт в мире




Статистика причин искусственного аборта






- Девушки, вступившие в половую связь до 20 лет
- Девушки, вступившие в половую связь после 20 лет




- Девушки, прервавшие первую беременность
- Девушки, оставшиеся бесплодными

Статистика аборт в России

Ежегодно в России выполняется более 6 млн. абортов.



Сведения о прерывании беременности по Российской Федерации за 2015 год



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Женщина, решающаяся на искусственное прерывание беременности, всякий раз стремится избежать «большого зла».

Беременных женщин, имевших в прошлом искусственный аборт, относят к так называемой группе беременных повышенного риска перинатальной патологии. Это в первую очередь относится к первым и последующим абортам у нерожавших женщин. Они находятся под особо тщательным наблюдением врачей акушеров-гинекологов женских консультаций, чтобы предупредить (снизить) возможную у них материнскую и перинатальную патологию

Показатель числа абортов в России на 1000 женщин фертильного возраста в 2002 году составил 45,8, в США – 21,3, в Финляндии – 11,7. и хотя в России в последние годы отмечается некоторое снижение количества абортов и повышение рождаемости, демографическая ситуация в стране остается критической .

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

