

y3B

Оборот воды в УЗВ

Под «**установками замкнутого водоснабжения**» понимают полную регенерацию и использование воды любое количество раз для водоснабжения бассейнов (рыбоводных емкостей).




Рисунок 1. Схема рыбного хозяйства с установками замкнутого водоснабжения (УЗВ) для выращивания рыбы



При этом в УЗВ осуществляется:
очистка воды от загрязнений в процессе
выращивания рыбы (органика);
поддержка надлежащего санитарного
состояния воды на безопасном для
выращиваемых рыб уровне;
восстановление как химического, так и
газового режима воды;
обеспечивается температура для
получения максимального эффекта от
выращивания рыбы в УЗВ.

В УЗВ потребность в свежей воде выявляется удаляемыми из УЗВ отходами — рыбоводного осадка, потерями воды на испарение в установке замкнутого водоснабжения, на протечки в оборудовании и на прочие цели, не связанные с качеством воды: заполнение емкостей для транспортировки рыбы и т.п. На заметку.

Обычная потребность УЗВ на пополнение потерь воды — 2-5 процентов за сутки от всего объема воды в системе.

Биологическая регенерация воды в УЗВ
При использовании УЗВ для разведения рыбы – осетров, клариевого сома, форели, судака, речного угря или теляпии – основным процессом биологической регенерации по химическому составу воды выступает освобождение воды, обрабатываемой в УЗВ, от основного компонента – соединений азота, который накапливается в системе замкнутого водоснабжения при жизнедеятельности разводимой рыбы в УЗВ.

При аэробной биологической очистке, осуществляется перевод азота органических соединений, содержащихся в УЗВ в не съеденных, растворенных кормах и в виде экскрементов в аммонийный азот, перевод аммонийного азота в неорганической форме, который появляется в процессе разложения загрязнений и выделяемого выращиваемой рыбой через почки, жабры и кожные покровы, в нитритную форму, а после в нитратную.

Этапы превращения азота производятся различными группами микробного населения биологической плёнки оборудования биологической очистки. Это финишный процесс аэробного превращения азотных соединений.

На заметку. Для получения икры в УЗВ целесообразно и лучше всего выращивать бестера, который быстрее созревает для дачи черной икры. Первый раз самка бестера даёт икры не более семи процентов от своего веса, далее выход икры возрастает до 20%! Обычный осётр даёт в два раза меньше черной икры.

Далее превращение нитратов в свободный азот (газ) осуществляется анаэробными бактериями при ограничении поступления кислорода. Этот процесс носит название денитрификация, и выполняется в денитрификаторах. При этом требуется поддержание энергетического питания бактерий подачей в систему этанола и мелассы. Газообразный азот выводится из УЗВ в окружающую атмосферу.

<p>Атлантический лосось</p> 	<p>Легко выращивается. Успешное выращивание молодого лосося в УЗВ. Выращивание крупного лосося в УЗВ может стать успешным в будущем.</p>	<p>На мировом рынке преобладают норвежские производители.</p>
<p>Радужная форель</p> 	<p>Легко выращивается. Широко используются УЗВ, от подращивания мальков до выращивания порционной рыбы.</p>	<p>Жесткая конкуренция, часто основанная на местных рыночных условиях.</p>
<p>Судак</p> 	<p>Трудно выращивается. Проблемный личиночный этап, относительно простой нагул.</p>	<p>Неплохие цены. По мере снижения природных запасов ожидается увеличение спроса.</p>
<p>Осетровые</p> 	<p>Легко выращиваются. Требуют опыта в области подращивания личинок и получения пищевой икры.</p>	<p>Хорошие рыночные условия для мяса и икры.</p>
<p>Угорь</p> 	<p>Успешный объект рыбоводства в УЗВ. Воспроизводство невозможно. Необходимо ловить молодь в природе.</p>	<p>Ограниченный рынок с непостоянным уровнем цен.</p>
<p>Баррамунди</p> 	<p>Требует знаний в области подращивания личинок. Нагул относительно простой.</p>	<p>Реализуется, главным образом, на местных рынках по неплохой цене.</p>
<p>Груперы</p> 	<p>Требуют знаний в области подращивания личинок. Нагул относительно простой.</p>	<p>Реализуется, главным образом, на местных рынках по хорошей цене.</p>
<p>Сибас и дорада</p> 	<p>Требуют опыта на личиночных стадиях. Хорошо растут в УЗВ.</p>	<p>Сложные рыночные условия.</p>
<p>Тюрбо</p> 	<p>Требует опыта в области подращивания личинок. Очень хорошо растет в УЗВ</p>	<p>Неплохие рыночные цены, зависящие от местных рыночных условий.</p>
<p>Морской язык</p> 	<p>Новый объект аквакультуры с еще не полностью разработанной технологией. Различные препятствия.</p>	<p>Высокие цены.</p>
<p>Треска</p> 	<p>Успешное подращивание мальков в УЗВ. Нагул крупной трески требует дальнейших разработок.</p>	<p>Цены колеблются и все еще зависят от природных уловов.</p>

1. Компоненты УЗВ - Насосы
2. Компоненты УЗВ - Теплообмен
3. Компоненты УЗВ - Регуляция уровня рН
4. Компоненты УЗВ - Озон
5. Компоненты УЗВ - Ультрафиолетовое излучение
6. Компоненты УЗВ - Оксигенация
7. Компоненты УЗВ - Дегазация, аэрация и зачистка
8. Компоненты УЗВ - Биологическая очистка
9. Компоненты УЗВ - Механическая фильтрация
10. Компоненты УЗВ - Рыбоводные бассейны
11. Компоненты УЗВ - Поступающая вода
12. Компоненты УЗВ - Аварийные системы
13. Компоненты УЗВ - Мониторинг, контроль и сигнализация
14. Аквакультура в установках замкнутого водоснабжения

Схема движения воды и принципиальная схема

