


# Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ – түрік университеті



Факультеті: Медицина

Кафедрасы: Акушерлік іс және гинекология

Тақырыбы: HELLP- синдромы

Қабылдаған: Нұрқасымова Р.Ғ

Орындаған: Пернебеков Е.А

Тобы:ЖМ-905


Түркістан -

- Hellp синдромы- акушерияда сирек кездесетін ағымы ауыр патология. Синдромның қысқартылған алғашқы әріптері төмендегіні білдіреді:
  - Н – Hemolysis (гемолиз);
  - EL – elevated liver enzymes (бауыр ферменттерінің белсенділігінің артуы);
  - LP – low platelet count (тромбоцитопения).

- Бұл синдром алғашырет 1954 жылы Дж.А. Притчардом, ал Р.С. Гудлин мен авторластары 1978жылы синдромның преклампсияда дамитының байқаған. 1982 жылы Л. Вейнштейн синдромның ерекше патологиялық триадасын біріктірген.

■ Эпидемиология. Гестоздың ауыр жағдайында өтетін Hellp-синдромы әйелдерде ең жоғарғы көрсеткіш 75%, және перинатальды өлімдерде 1000 сәбиге дейін, оның 4-12 % ғана диагностика арқылы емдеуге болады.

## ❑ Hellp преэклампсияда



## Классификация

- Лабораториялық зерттеулерге негізделе отырып кейін авторлар HELLP-синдромын бытай жіктейді:  
Л.А Ван Дам және авторластары тамыр ішілік коагуляцияға карай: анық, күдікті және жасырын.

Дж.Н. Мартина бойынша:



Бірінші класс – қандағы тромбпциттер саны  $50 \times 10^9/\text{л}$  аз.

Екінші класс – қандағы тромбациттер концентрация  $50-100 \times 10^9/\text{л}$  аралығында.

- ❑ HELLP синдромының клиникасы 3 категорияда зерттеледі:
  - ❑ Топ 1: ең қауыпты формасы және тромбоцит саны 50.000 нан аз болады
  - ❑ Топ 2: тромбоцит саны 50.000-100.000 аралығында.
  - ❑ Топ 3: тромбоцит саны 100.000 нан артық болады.

- HELLP гепатоз кезінде





## Этиологиясы

- Иммуносупрессия
- Аутоиммунды агрессия
- Простациклинстимульдаушы факторлар төмендеуі.
- Гемостаз жүйесіндегі өзгерістері.
- Бауырдағы ферменттердің генетикалық дефектісі.
- Дәрілік препараттар (тетрацилин, хлорамфеникол).

- HELLP-синдромының қалай дамығаны накты анықталған жоқ. Сонғы зерттеулерде плацента дамыған кезде пайда болған бір бұзылыс себеп болады деп айтылған. Плацентадағы көп жінішке қантамырларында пайда болған қан қүолулар және тарылулар негізгі себеп болуы мүмкін.




- Синдром дамуында қауіпті факторлар:

- Тері түсінің ағарып бозаруы.
- 25 жастан жоғары жүкті әйелдерде .
- Көп туған әйелдерде.
- Көп ұрқты жүктілік.
- Соматикалық патологияның айқындалуы.

# Патогенезі

## ТОЛЫҚ АНЫҚТАЛМАҒАН:



- HELLP синдромының негізгі патогенезне тамыр эндотелиінің аутоиммунды зақымдануынан пайда болған фибролизденген микротромбтардың нәтижесінде қанның сұйылуы. Эндотелидің зақымдануы нәтижесінде тромбациттер агрессиясы күштейеіп, өз кезегінде фибриннің, коллаген талшықтарының, жүйелік компоненттердің, IgG және IgM патологиялық процесін шақырады. Аутоиммунды процес бауыр синусы мен эндокардта да анықталады. Осыған байланысты HELLP синдромында жоспарлы түрде глюокортикоид пен иммунодепресант қолданады. Тромбоциттер бұзылуы нәтижесінде тромбоксандардың босап шығуы және тромбоксан-простациклин тепе-тендігі бұзылып, артериоласпазм нәтижесінде АГ, миәсінші тырысу болады.

- HELLP синдромын ананың ұрыққа қолайлыша жағдай тудырмакқа бағытталған таксиқоздың асқынған белгісі ретінде қарайды.
- Макроскопиялық түрғыдан HELLP синдромын бауыр көлемінің ұлғаюы, консистенциясының тығыздалуы мен субкапсулярлы қан құйылуды айтады.
- Микраскопиялық зертеуде перипортальды геморрагия, бауыр синусында фибрин, IgM, IgG шөгінділері, гепатоциттердің мультилобулярлы некрозы анықталады.

- **Гемолиз:** эритроциттердің ыдырауы және 120 күннен аз өмір сұруі. HELLP те көрінетін гемолиз микроангиопатиялық гемолиз. Нетижеде гемолиттік анемия пайда болады. Эритроциттер ыдыраса құрамы тікелей канға қатысады және қан билирубин дengейі жоғарылайды. Науқаста сары ауру көрінеді. Эритроцит жойылуы болғанда денеміз бұған қанның сұйықтық бөлігін арттырумен жауап береді.

- Клиникалық көрінісі: Hellp синдромы жүктілік кезінде III триместрінде пайда болады және 35 аптада жиікездеседі. Жүрек айнуы, құсу, эпигастральды аймақта ауырсынулар, гиперрефлексия, бас ауруы, шаршау және басқа да диспепсиялық көріністердің байқауға болады. Аурудың белгілеріне сарғаю, инъекция жасалған жерлердің қанталауы, қан құсу, үдемелі бауыр жетіспеушілігі, тырысу және айқын кома жатады.

## HELLP-синдромының кең тараган белгілері

<b>Белгісі</b>	<b>HELLP- синдром</b>
<b>Эпигастральдың аймақтың ауырсынуы не оң қабырға асты</b>	+++
<b>Бас аурұры</b>	++
<b>Сарғаю</b>	+++
<b>Артериальды гипертензия</b>	+++/-
<b>Протенинурия ( 5 г/тәулік көн)</b>	+++/-
<b>Перифериялтық ісіну</b>	++/-
<b>Күсу</b>	+++
<b>Жүрек айну</b>	+++
<b>Минемесе көрудің нашарлауы</b>	++/-
<b>Олигурия ( 400 мл/тәу көн)</b>	++
<b>Жедел тубулярлық некроз</b>	++
<b>Корковый некроз</b>	++
<b>Гематурия</b>	++
<b>Панциропитуитаризм&lt;</b>	++
<b>Өкпе ісінуі немесе цианоз</b>	+/-
<b>Әлсәздік, шаршагыштық</b>	+/-
<b>Асказаниан қан кету</b>	+/-
<b>Инъекция аймағының қанталауы</b>	+
<b>Үдемелі бауыр жетіспеушілтігі</b>	+
<b>Бауырлық кома</b>	+/-
<b>Судороги</b>	+/-
<b>Қызба</b>	++/-
<b>Тері қышуы</b>	+/-
<b>Дене салматының төмендеуі</b>	+
<b>Ескерту : ++++, ++, +/- — белгінің айқындылығы.</b>	

- Бұйректерде сыртқа шығарылатын сұйықтық мөлшері азаяды. Сол себептен HELLP науқастарында зәр бөлу аз болады. Қанның сұйық бөлігінің артуымен оттегі тасу қабілеті төмендейді, жүрекке түскен жүк артады және гипертензия жоғарылауы жалғасады. Бұл гипертензия ортада сұйық тамыр сыртына, клетка қуыстарына қашады және ісіну пайда болады. Дене бұл жаңа қан айналу жүйесіне бағынады. Оттегі тасу қабілеті төмендеген қанды оттегіні ен көп керек ететін ағзаларға(ми, жүрек, бұйрек, т.с.с.) жіберуге тырысады. Ең аз үлес теріге түседі.

- ❑ Hellpr синдромына күдікті жағдайларда көбінese лабораторлы зерттеулер жасау керек:
- ❑ АЛТ,АСТ активтілігін анықтау.
- ❑ Лактатдегидрогеназа
- ❑ Билирубин концентрациясы
- ❑ Гаптоглобин
- ❑ Зәр қышқылы
- ❑ Қандағы тромбоциттер санын анықтау керек.

- Тері астындағы өте жінішке тамырлардың зақымдалуы нетіжесінде кіші көгерулер пайда болады. Сондыктан HELLP науқастарының беті ағарады. Бұл өзгерістерге байланысты науқаста кейбір шағымдар пайда болады.  
Бұлар:

- Тыныс алуда қиналу
- Бас ауруы
- Көру бұзылыстары
- Жүрек айну
- Ісіну

# Тромбоцитопения

- Қандағы тромбоцит санының азайуын **тромбоцитопения** деп айтамыз. Нормада ересек адамда 140.000-400.000 тромбоцит бар. Бұл сан 50.000-ан түскенде ортада басқа себептер болмасада қанаулар болады. Сондықтан тромбоцитопения өте қауіпті жағдай.

- **Бауыр ферменттерінің денгейінің артуы.** Бауыр ішінегі өте кіші тамырлардың да зақымдалуы және қысылуы нетижесінде бауырдан сыртқа қарай қан ағуы бұзылады бауыр керіледі, бауырдан секрецияланатын ферменттер көбеюі байқалады.

# Симптомдар

- HELLP-ауруларының 90% белгі береді.

*Ең жиі байқалатын шағымдар:*

- Асқазан аймағында ауырсыну (эпигастрлик ауырсыну) (65%)
- Жүрек айну және құсу(30%)
- Бас ауыруы(31%)

Басқа симптомдарға гипертензия, зәрмен белок жойылу, ісіну, шаршағыштық, сары ауыру сияқты бейспесификалық шағымдар жатады.

Эпигастрикалық ауырсынуның себебі бауырдың ісінуі және керілуі.

- **Ана мен балаға төнетін қауіптер.**
- Жүктілікте гипертензиясы болған ананың бүйрекінің зақымдалу қауіпі жоғары. Бала туылғаннан кейін қан қысымының қалыпқа келмеуі және созылмалы гипертензияға әкелуі мүмкіндігі бар.
- HELLP синдромы бар науқастарда қосымша:
  - Бауыр жыртылуы
  - ДВС(dissemine intravascular koagulasion)
  - Плацентаның ерте ажырауы және бұған байланысты дамыған компликациялар
  - Жедел бүйрек жетіспеушілігі
  - Кез келген бір тінде оттегі жетіспеушілігіне байланысты инфаркт.

- Гипогликемия
- Панкреас қабынуы
- Нейрологиялық бұзылыстар
- Миден қан кету
- Өкпенін ісінуы
- Мидын ісінуы
- Тыныстық проблемалар
- Өлім сияқты компликациялар  
көрінеалады. Ен жиі ана өлу себебі  
бауыр жыртылуына байланысты  
бірден және тез күрсақ ішілік қанаулар

- HELLP синдромы бар анада түйлған балада көрінетің проблемалар.
- Дамуы төмен
- Түйлғаннан кейін тыныстық көмекке қажеттілік
- Төмен қан гликозасы
- Төмен тромбоцит саны
- Жоғары эритроцит саны
- Төмен лейкоцит саны
- Жүрек қан айналу системасы аномалиялары
- Бұлшық ет тонусын төмендеуі
- Төмен кальций дengейі
- Төмен қан қысымы

## **Болжамы:**

Босанудан кейінгі кезеңнің асқынусыз өтуінде симптомдардың регрессиясы байқалады. Босанудан кейін лабораториялық көрсеткіштер 3-4 күнде қалыпқа келеді.



HELLP  
SYNDROME

Medical Dictionary • Bibliography • Annotated Research Guide

© 2000-2001 HELLP Syndrome Support Group

# Womb

— uterine wall

— placenta

— umbilical  
cord

**Назар  
аударғандаръынчылға  
тахмет**

