

**Богомол. Житель
Черноморского побережья
Кавказа.**


Кузнецов
Тимофей.
Ученик 4 Б
класса.



В мире известно около 2-х тысяч различных видов богомолов. Обычный богомол имеет размер около 6-ти сантиметров в длину. Их обычная пища – насекомые. Однако в некоторых случаях такой богомол может убить и съесть ящерицу длиной до 10-ти сантиметров. Длительность жизни взрослого насекомого – 55-60 дней .



Очень интересна и разнообразна окраска богомолов. С ее помощью они маскируются под среду обитания. Она в точности может совпадать с цветом веток, цветов, травы, листьев деревьев и камней, среди которых они прячутся. Если богомол неподвижен, его практически невозможно заметить в природной среде.



Наиболее широкое распространение имеет **богомол обыкновенный** (*Mantis religiosa*). Он обитает на территории от Южной Африки до Кавказа, Средней Азии, юга средней полосы России.

Обыкновенный богомол играет полезную роль в сельском хозяйстве как истребитель вредных насекомых



Кроме богомола обыкновенного, на Кавказе обитает **пятнистокрылый богомол** (*Iris polystictica*) или, он имеет еще название, **богомол пятнистый**.



Также на черноморском побережье Кавказа водятся **богомолы** **рода Эмпуза**. Эти насекомые значительно крупнее богомолов обычных. Они имеют довольно характерную внешность с треугольной заостренной головой и торчащим впереди, длинным выростом, что придает им сходство с маленьким чертиком.



**В последнее время,
в результате
распашки земель и
уничтожения густого
разнотравья
(основных мест
обитания этих
насекомых), в
некоторых местах, в
частности в Крыму,
богомолы
становятся редкими
представителями
фауны. К таковым
относятся
боливарии, эмпузы,
пятнистокрылые
богомолы.
Для сохранения этих
насекомых
создаются
заповедные зоны.**





КОНЕЦ!