

**Богомол. Житель  
Черноморского побережья  
Кавказа.**


Кузнецов  
Тимофей.  
Ученик 4 Б  
класса.



В мире известно около 2-х тысяч различных видов богомолов. Обычный богомол имеет размер около 6-ти сантиметров в длину. Их обычная пища – насекомые. Однако в некоторых случаях такой богомол может убить и съесть ящерицу длиной до 10-ти сантиметров. Длительность жизни взрослого насекомого – 55-60 дней .



Очень интересна и разнообразна окраска богомолов. С ее помощью они маскируются под среду обитания. Она в точности может совпадать с цветом веток, цветов, травы, листьев деревьев и камней, среди которых они прячутся. Если богомол неподвижен, его практически невозможно заметить в природной среде.





Наиболее широкое распространение имеет **богомол обыкновенный** (*Mantis religiosa*). Он обитает на территории от Южной Африки до Кавказа, Средней Азии, юга средней полосы России.

Обыкновенный богомол играет полезную роль в сельском хозяйстве как истребитель вредных насекомых



Кроме богомола обыкновенного, на Кавказе обитает **пятнистокрылый богомол** (*Iris polystictica*) или, он имеет еще название, **богомол пятнистый**.




Также на черноморском побережье Кавказа водятся **богомолы** **рода Эмпуза**. Эти насекомые значительно крупнее богомолов обычных. Они имеют довольно характерную внешность с треугольной заостренной головой и торчащим впереди, длинным выростом, что придает им сходство с маленьким чертиком.





**В последнее время,  
в результате  
распашки земель и  
уничтожения густого  
разнотравья  
(основных мест  
обитания этих  
насекомых), в  
некоторых местах, в  
частности в Крыму,  
богомолы  
становятся редкими  
представителями  
фауны. К таковым  
относятся  
боливарии, эмпузы,  
пятнистокрылые  
богомолы.  
Для сохранения этих  
насекомых  
создаются  
заповедные зоны.**





***КОНЕЦ!***