



Брадикардии


Лекция






-Что такое брадикардия?

-Брадикардией называют состояние с частотой возбуждения предсердий и/или желудочков < 60 в мин.




В практической медицине основное значение имеет частота желудочковых сокращений (ЧСЖ)



-Есть ли классификация брадикардий?

-Есть. Брадикардии бывают при

1. Дисфункции синусового узла (СССУ),
1. АВ блокаде 2-3 степени,
2. Экстрасистолии (блокированная, бигеминия),
3. Предсердной тахикардии (блокированная)









-А как это... «блокированная»?

Посмотрите на ЭКГ. Это
блокированная предсердная
тахиардия с паузой 3224
мсек.

Видны зубцы Р, которые не проводятся на
желудочки, поэтому после них нет
комплексов QRS.





-Есть ли классификация брадикардий?

-Есть.

В зависимости от течения

б. бывают


1. Пароксизмальные
2. Хронические

В зависимости от симптомов

1. Бессимптомные
2. Симптомные

- Сердечная недостаточность
- Артериальная гипертензия
- Стенокардия
- Обморок
- Транзиторная ишемическая атака





-Каковы причины брадикардии?

-Причин очень много. Давайте рассмотрим.



1. Поражения миокарда

- ИБС
- Кардиомиопатии
- Миокардит
- Кардиосклероз
- Операции

2. Ваготония

- Синдром каротидного синуса
- Вазовагальный обморок
- Повышение внутричерепного давления
- Болезни гортани
- Болезни пищевода
- Кардиоверсия
- Рефлекс Бецольда Яриша (брадикардия-гипотония при повышении внутрижелудочкового давления)






1. Лекарственные препараты

- Бета-блокеры,
- Антагонисты кальция недигидропиридинового ряда,
- Сердечные гликозиды,
- ААТТ 1А и 1С классов,
- Амиодарон,
- Соталол,
- Резерпин,
- Альфа2-агонисты(клонидин, метилдопа),
- Холиномиметики(прозерин),
- Морфин,
- Тиопентал натрия.





4. Электролитные нарушения

- Гиперкалиемия, гипекальциемия


5. Метаболические нарушение


- Гипотиреоз,
- Холестаз

6. Врожденные аномалии синусового и АВ узла

7. Идиопатическая

- Важно отметить, что симптомная брадикардия на фоне приема лекарственных препаратов наблюдается чаще всего у пациентов уже имеющих патологию синусового узла, АВ узла или системы Гиса-Пуркинье.






-Каково клиническое значение брадикардии?

Важным фактором, определяющим Клинику брадикардии, является **снижение СВ**, приводящее к

- застойной сердечной недостаточности,
- артериальной гипотензии,
- энцефалопатии и т.д.

Клиническое значение брадикардии определяется


- Ее опасностью для жизни пациента,
- Травматизмом (падения, ДТП),
- Страданиями,
- Снижением трудоспособности
- И другими ограничениями, обусловленными расстройством сердечного ритма.





-Как при брадикардии развиваются гемодинамические нарушения?

- Можно представить это
схематически.






Как доказать, что гемодинамические нарушения связаны с брадикардией?



- Чтобы доказать связь аритмии и симптомов можно использовать следующие приемы и методы:
 - Регистрация ЧСС или ЭКГ во время симптома.
 - Суточное мониторирование ЭКГ и АД.
 - Уточнение функции синусового узла и нарушения проводимости при ЭФИ.
 - Лечение «ex juvantibus» (установка ЭКС при недостаточно документированной связи брадикардии и симптомов).







Зачем надо доказывать связь брадикардии и гемодинамических нарушений?

-От этого в значительной мере
выбор тактики лечения.

- Бессимптомные брадикардии обычно не требуют лечения, в то время как
- при наличии симптомов и признаков явной дисфункции синусового узла (например, синусовая брадикардия <30-40 в мин или паузы более 3сек) рекомендуют ЭКС





Это можно представить схематически.





Рис. 139. Тактика обследования и лечения при брадикардии на ЭКГ.



Как проводится диагностика брадикардии?




Диагностика при брадикардии может быть условно разделена на методы выявления брадикардии и причинных или предрасполагающих факторов.



1. Диагностика брадикардии включает:

- ЭКГ покоя(длительная запись в отведении II или V1)
- Холтеровское мониторирование
- Событийное транстелефонное мониторирование ЭКГ
- Электрофизиологическое исследование (чреспищеводное, внутрисердечное)



2. Диагностика формы брадикардии


(первичная, вторичная)

- Тест с атропином
- Полная вегетативная блокада

3. Диагностика причин брадикардии

- ЭхоКГ
- Биохимический анализ крови: калий, натрий, магний, глюкоза, креатинин, билирубин, щелочная фосфатаза, холестерин.
- Показатели воспаления: СРБ, сиаловая кислота, СОЭ, альфа2-глобулины.
- Сердечные биомаркеры: креатинкиназа(МВ), тропонины.
- Оценка функции щитовидной железы: ТТГ, сывT4, сывT3.
- Консультация невропатолога, ЛОР - врача
- Фиброззофагоскопия.






Какова тактика лечения брадикардии?

Выбор лечения существенным образом зависит от наличия осложнений брадикардии. Вначале следует уточнить является ли причина брадикардии преходящей или обратимой, и по возможности ее устраниТЬ.





Что делать при острой тяжелой брадикардии?



При острой брадикардии с тяжелыми гемодинамическими нарушениями показано экстренное лечение брадикардии.

I этап

- Атропин 0.5мг в/в повторять через 3-5 мин до эффекта или дозы 3мг . При ИМ дозы ≤2мг.
- Наружная ЭКС


II этап

- Адреналин 2мкг/мин (1мг на 250мл, 0.5 мл/мин) - 10мкг/мин.
- Допамин 2мкг/кг/мин (~200мг на 500мл, 2.7 мл/мин) - 10мкг/кг/мин
- Теофиллин 100-250мг (5-10мл, 2.4%) струйно
- Подготовка к эндокардиальной ЭКС


III этап

- Эндокардиальная ЭКС






Что делать если причина брадикардии не является преходящей?



Если преходящая или обратимая причина брадикардии исключена, то показанием к имплантации к ЭКС слушателю не столько этиология брадикардии, сколько ее тяжесть.





Какой тип ЭКС следует имплантировать?

Выбор режима ЭКС зависит от вида аритмии.

Выбор режима электрокардиостимуляции в зависимости от вида аритмии

| Аритмия | Условие | Режим ЭКС |
|----------------------------|---|-------------|
| Дисфункция синусового узла | Нет АВ блокады (т. Венкебаха > 130–140 в мин) | AAI |
| | АВ блокада (в том числе возможная) | DDD, VVI |
| | Пароксизмальная ФП без АВ блокады (в том числе возможной) | AAI |
| | Пароксизмальная ФП с АВ блокадой (в том числе возможной) | DDD |
| | Постоянная ФП | VVI |
| Полная АВ блокада | Синусовый ритм, возможна редкая предсердная тахикардия | VDD, DDD |
| | Синусовый ритм с частыми предсердными тахикардиями | DDD |
| | Постоянная ФП или остановка синусового узла | VVI |





Спасибо за лекцию.

Спасибо за внимание.

