

Дизентерия

Выполнили: Дука Анастасия,
Панкратова Марина
1 курс 5 группа



бактерии рода *Shigella*

- Дизентерия (или шигеллез) относится к группе острых кишечных инфекций – заболеваниям с фекально-оральным механизмом передачи, которые характеризуются симптомами общей интоксикации и диареей.

Как происходит заражение дизентерией?



- Существует несколько путей передачи возбудителя. Это контактно-бытовой путь – через немытые руки при несоблюдении правил личной гигиены; пищевой – при попадании бактерий в продукты питания; а также водный – при употреблении инфицированной воды. Кроме того, заражение возможно при купании в загрязненных водоемах.

Осложнения и последствия дизентерии

Дизентерия опасна тяжелыми осложнениями, как обусловленными поражением кишечника, так и внекишечных.

- Выпадение прямой кишки.
- Обезвоживание
- Кишечное кровотечение
- Токсический мегаколон
- Гемолитико-уремический синдром
- Гемолитико-уремический синдром
- Сопутствующие инфекции



Диета при дизентерии



Рекомендуемые продукты:

пшеничные сухари

супы на обезжиренном мясном или рыбном бульоне

нежирный свежеприготовленный творог.

каши на воде: овсяная, гречневая, рисовая.

овощи только в отварном виде при добавлении в суп.

Продукты, которые следует исключить:

хлебобулочные и мучные изделия;

супы с овощами

жирное мясо, мясо куском, колбасы;

цельное молоко и другие молочные продукты;

пшеничную, ячневую, перловую каши; макаронные изделия;

овощи, фрукты, ягоды в сыром виде;

кофе и какао с молоком, газированные и холодные напитки.



Лечение дизентерии

- При наличии признаков обезвоживания принимают солевые растворы: Регидрон.
- Сорбенты применяются для уменьшения проявлений диареи: Смекта, Энтеросгель 3 раза в день.
- Прием лоперамида (имодиума) противопоказан!!! Противодиарейные средства замедляют высвобождение возбудителя из просвета кишечника, что может замедлять течение заболевания и утяжелять симптомы.
- Антибиотики





Спасибо за внимание!