

Домашние птицы.  
Птицеводство.

# История разведения

Человек приручил кур больше 8 тысяч лет назад. Это были дикие банкивские куры, которые, до сих пор водятся в джунглях Юго-Восточной Азии. С того времени для своих целей людьми было выведено около 1000 самых разных пород кур. Сегодня официально зарегистрировано почти 700 пород. Из них 32 породы куриц считаются исчезнувшими навсегда, а 286 находятся на грани исчезновения. Среди этих 700 пород есть очень редкие - китайские шелковые куры, которых в мире не больше 15000 голов. А есть такие, поголовье которых приближается к 250 миллионам: это такие породы как нью-гемпшир. В России существует около сотни видов отечественной селекции, самые известные из них это московская, русская пушкинская порода кур.

# Банкивские куры

- Чарльз Дарвин считал, этот вид является родоначальником домашних кур. Дикие банкивские куры легко приручаются. Их одомашнивание произошло в Китае и Юго-Восточной Азии около 6000 лет до н. э., в Индии — около 3000 лет до н. э. Отсюда куры были распространены в Европу.



# Банкивские куры

- Небольшая птица. Длина самца 66 см, вес 900–1250 г; вес самки 500–750 г. Окраска самца красновато-золотистая на спинной стороне, черновато-бурая — на брюшной. Перья на голове, шее, затылке и на верхней стороне хвоста — золотисто-жёлтые. Спина пурпурно-бурая, грудь и рулевые перья чёрно-зелёные, крылья бурые. Гребешок на голове красный, клюв буроватый. Ноги аспидно-чёрные. Самка меньше самца, имеет более короткий хвост и отличается менее яркой, буроватой, окраской: шейные перья её чёрные с жёлтыми краями, нижняя сторона тела грязно-бурая с более светлыми пятнами на стержнях перьев, спина буро-серая.



# Самые известные породы кур по направлениям:

- Яичные: русская белая, леггорн, брекель.
- Мясные: кохинхин, брама, корниш, фавероль, суссекс.
- Универсальные: плимутрок, форверк, нью гемпшир, фавероль, род айленд, московская, амрокс, кучинская, московская белая, котляревская, орпингтон, ленинградская и голландская ситцевые, ливенская порода кур.
- Декоративные и необычные: бентамка, виандот, черная голландская белохохолка, падуан, сибрайт, курчава, шелковые куры, андалузская.
- Голосистые: юрловская голосистая.

# Яичные породы кур

Яичные породы кур впервые были выведены еще в Древнем Египте, откуда перешли они в Древний Рим и распространились по всей Европе, в том числе и в России.

Общие свойственные только яичным курам черты, а именно:

- вес яичных кур от 2.2 до 3 килограмм;
- тело курицы маленькое, перья мягкие, небольшие, но хорошо развитые;
- куры ведут весьма подвижный образ жизни, их даже можно считать непоседами;
- каждые 25 часов курица сносит не менее 1 яйца;
- хорошо питаются, но постоянно страдают от нехватки кальция, идущего на образование яичной скорлупы;
- за первый год жизни яичные куры сносят от 160 и до 200 яиц, количество которых зависит, прежде всего, от условий содержания и кормления птиц;
- зависят от света, продолжительность светового дня для них не должна быть менее 14 часов;
- у всех яйценосных кур производительность снижается на второй год жизни, потому их целесообразно содержать более одного года.

# Леггорн



- Жители Америки первыми приступили к изучению куриных пород с целью выведения птиц наиболее подходящих для получения большого количества яиц. в конце 20-х годов прошлого века куры этой породы были завезена в Россию. Изначально это белая небольшая, но очень пушистая курица. Количество снесенных яиц за год равняется 170-200 штукам. Яичная скорлупа плотная, белая, чистая, никаких пятнышек на здоровых яйцах не наблюдается.

# Брекель

- Домашние куры под названием брекель известны уже многие столетия, родина Бельгия. Относится к яичному типу, яйценоскость не менее 250 яиц в год. Существует две разновидности: брекель золотистый и брекель серебристый. В нашей стране большей популярностью пользуется брекель серебристой окраски. У них перья на голове и шее - серебристо белые, хотя основание каждого пера - черное. А ниже каждое перо имеет полосатую черно-белую структуру. Птица эта очень активна, содержать ее в помещении сложно. Мясо его жилистое и жесткое. Максимальный вес несушки - 2,7 кг, петушка - 3 кг. Брекель - птица неконфликтная, легко уживается с другими видами. Правда, несушки брекель полностью утратили инстинкт высидывания - и разводить птенцов можно только в инкубаторе или подкладывая яйца под других наседок.





# Мясные породы кур

- Если сравнивать кур мясного направления с другими, то можно сказать, что эти птицы отличаются более массивными габаритами, коренастым телосложением, короткими и толстыми конечностями, рыхлым оперением и довольно спокойным нравом. Как правило, мясные куры демонстрируют средние показатели яйценоскости.
- Как правило, мясные куры не требуют каких-либо особенных условий содержания. Безусловно, они должны иметь в распоряжении чистый и ухоженный загон, не испытывать дефицита воды и еды, а также иметь возможность укрыться от света, ветра и осадков.
- Рассчитывать размер загона следует из соотношения 10-15 птиц на 1 кв.м. Для того чтобы цыплята росли здоровыми и быстро набирали вес, в их рационе обязательно должны быть пшено, дробленый овес и пшеница, а также творог, вареные яйца и сыворотка.

# Кохинхин

- **Кохинхин** — мясная порода кур родом из Вьетнама. Из-за относительно низкой плодовитости в промышленном птицеводстве России практически не используется, однако разводится любителями как декоративная порода. Для породы характерны нежно-рыхлая конституция, маленькая голова, густо оперенное туловище и конечности, одетые в пышные «штаны». Окраска оперения различна: палевая, черная, белая, куропатчатая и др. Молодняк теплолюбив и оперяется медленно. Взрослые куры неприхотливы как по отношению к корму, так и к температуре. Птица спокойна, склонна к ожирению и хорошо переносит содержание в тесных клетках. Куры хорошо сохраняют инстинкт насиживания, заботятся о цыплятах. Живая масса от 3,5 до 5,0 кг. Яйценоскость 100–110 яиц в год, окраска скорлупы желто-бурая г.



# Брама

- Куры Брама начинают нестись поздно, в 7,5–8 месяцев. Яйценоскость 100–120 яиц в год. У кур старше 2-х лет яйценоскость резко падает. Масса яйца 56–60 г. Живая масса кур брамы от 3,0 кг до 4,5 кг. Цыплята брама растут медленно, и выведенные позже июня могут не перезимовать. Молодняк старше 4–5 месяцев необходимо держать отдельно от молодняка других пород, а также взрослой птицы.



**Корниш**



**Накед Нек или  
Голошейный бройлер**



Суссекс



Лангшан



# Куры универсальных пород

- Фавероль



# Куры универсальных пород

Нью-гемпшир



Род-Айленд



# Куры универсальных пород

Форверк



Амрокс





# Куры универсальных пород

- Куры плимутрок выведены в США во второй половине 19 века. В Россию первые представители привезены в 1911 году и сразу же стали очень популярными: они дают до 190 яиц в год (яйца крупные, светлые, до 60 г), а также, от 3,5 кг (курочки) до 5 кг (петушки) вкусного диетического мяса. стати, именно плимутрок полосатый получил у нас название «курочка Ряба», так как их оперение состоит из отдельных черных и белых перышек.

Плимутрок



# Куры универсальных пород

Орпингтон



Кучинская юбилейная



# Куры декоративных пород

Пушкинская

Курчавые куры



# Куры декоративных пород

## Шелковые куры



# Куры декоративных пород

Голландская белохохлая



Гамбургская



# Куры декоративных пород

Суматра



Виандот



# Куры декоративных пород

## Бетнамка Падуан



# Куры декоративных пород

Бетнамка



Бетнамка сибрайт





# Куры бойцовых пород

Вьетнамские бойцовые



Шамо



# Куры голосистых пород

## Югославская голосистая



# Чудо генетики

- Израильские генетики вывели новую породу абсолютно бесперых куриц.
- Основной идеей создания такой породы было желание вывести "удобную" курицу, которая сможет жить в жарких странах без специальных помещений с кондиционерами, ну и конечно же, отпадет потребность в общипывании тушек.



# Источники:

- Романов И.В. Биология. Животные. 8 класс (учебник для специальных (коррек.) образовательных учреждений 8 вида)
- <http://nalugah.ru>
- <http://animalreader.ru>
- <http://xn--e1aelkciia2b7d.xn--p1ai>
- <http://zooblog.ru>