

Фитопрофилактика и фитокоррекция нарушений иммунитета у новорожденных

Врач-неонатолог, фитотерапевт Гордеева Е.А.
ООО «Фитоцентр Гордеева М.В.», Москва, РФ


Формирование иммунитета плода



HLA-антигены отца –
залог нормального роста и развития плода



Иммунодепрессия при беременности, предохраняет плод от гибели



Факторы иммунной защиты плода

- плацентарный барьер и плодные оболочки
- материнские антитела класса IgG.
- антибактериальная активность околоплодных вод



Антиоксиданты и мембраностабилизаторы



Авторский сбор М.В Гордеева “Поливитамин”



Для беременных целесообразно увеличение взрослой дозы в 1,5 раза.

Иммунитет доношенного новорожденного



Антигенная стимуляция – условия развития иммунитета




Особенности иммунитета недоношенных новорожденных



Полноценность противостояния
иммунитета новорожденного
окружающей среде обеспечивает
грудное молоко!




Эхинацея (Echinacea purpurea)



Эхинацея повышает фагоцитарную активность

- моноцитов крови
- тканевых макрофагов
- нейтрофильных гранулоцитов
- стимулирует антителообразование

Доза: по 1 чайной ложке на 250 мл
кипятка в сутки.



Лиственница сибирская (*Larix sibirica*).

- усиление синтеза иммуноглобулинов класса М и G

Доза: по 1 чайной ложке на 250 мл кипятка в сутки.

При отсутствии высыпаний у ребенка
Целесообразно довести дозу
до 1 столовой ложки



Авторский сбор М.В Гордеева «Иммунофит»

Способ: через молоко матери.

Мать принимает сбор начиная с 1 чайной ложки раз в три дня увеличивая дозу на $\frac{1}{2}$ чайной ложки, постепенно доводя дозу до взрослой - 1 ст ложка на 250 мл кипятка.

Критерием увеличения дозы служит отсутствие высыпаний на кожных покровах ребенка и других признаков непереносимости.



Для недоношенных детей и для доношенных,
перенесших внутриутробное инфицирование
применяется

**Авторский сбор М.В Гордеева
- чайный напиток “Растишка”.**

