

Галлюцинаторно – бредовые синдромы

- Галлюцинозы
- Паранояльный
- Параноидный
- Галлюцинаторно-параноидный
- Психического автоматизма
- Парафренный

Галлюцинозы

- Галлюцинозы – состояния, клиническая картина которых практически, полностью исчерпывается наличием истинных галлюцинаций.
- Классификация галлюцинозов
- По типу течения: острые, хронические
- Острые сопровождаются аффектом растерянности, тревоги; характерно двигательное возбуждение.
- Хронические развиваются на фоне монотонного аффекта, характеризуются однообразием галлюцинаций.

Галлюцинозы

- Классификация по каналу анализатора
- Зрительные; слуховые; обонятельные; тактильные
- Зрительные при резком снижении остроты зрения (по типу Ш.Бонэ), на высоте интоксикации ПАВ.
- Слуховые при алкоголизме
- Обонятельные редко
- Тактильные- при хроническом отравлении солями тяжелых металлов.

Паранойяльный синдром

- ▣ 1 Интерпретативный бред
- ▣ 2 Стеничность
- ▣ 3 Гипермнезия
- ▣ 4 Аффективная напряженность
- ▣ 5 Обстоятельность мышления
- ▣ 6 Повышенная самооценка

Паранойяльный синдром

- Систематизированный паралогический первичный бред. Нет расстройств восприятия.
- При паранойяльном синдроме бредовые суждения отличаются большой стойкостью и систематизацией.
- Встречаются при реактивных, инволюционных, алкогольных психических заболеваниях

Параноидный синдром

- ▣ Структура параноидного синдрома состоит из отрывочного несистематизированного бреда различного содержания(отношения, преследования, величия, воздействия и т.д.), дополняемого иногда галлюцинациями и иными расстройствами восприятия, обычно нестойкими и всегда оттесняемые бредом на второстепенное место в картине состояния.
- ▣ Тип бреда образный, велика роль конкретной ситуации в которой находится больной. Нелепый.

Галлюцинаторно-параноидный синдром

- Синдромы при которых представлены в разных соотношениях галлюцинаторные и бредовые расстройства. При значительном преобладании галлюцинаций синдром именуют галлюцинаторным, при доминировании бредовых идей – параноидным.

Синдром психического автоматизма

- Синдром Кандинского – Клерамбо, синдром отчуждения, синдром воздействия
- Включает в себя псевдогаллюцинации, явления отчуждения психических актов – автоматизмы и бред воздействия.
- Пребывая во власти нарушений восприятия больной уверен в их насильственном происхождении, в их сделанности – в этом суть автоматизма.

Синдром психического автоматизма

- ▣ Выделяют три вида психического автоматизма
- ▣ Идеаторный; Сенестопатический; моторный
- ▣ 1 Идеаторный психический автоматизм-непроизвольное течение мыслей или представлений, управление, отнимание их. Заставляют мысленно произносить ругательства, вкладывают чужие мысли. К этой группе автоматизма относятся псевдогаллюцинации. Также отчуждают эмоции больного.

Синдром психического автоматизма

- Сенестопатический автоматизм заключается в том, что разнообразные тягостные ощущения в различных частях тела у больного возникают особым образом, непроизвольно, помимо его воли, под чьим-то воздействием. (аппараты; лучи и т.д.)
- Моторный (кинестетическом) психическом автоматизме- больным управляют, двигают руками, ногами, речью.

Парафренный синдром

- Включает систематизированный бред преследования, воздействия, материального ущерба, величия фантастического характера или отравления с явлениями психического автоматизма, а также с слуховыми и висцеральными галлюцинациями и псевдогаллюцинациями. Протекает на фоне повышенного настроения (эйфория).
- Сформированный парафренический синдром оказывается крайне стоек, инертен.

Парафренный синдром

- ▣ Структура парафренного синдрома
- ▣ 1 Нелепый бред преследования и воздействия
- ▣ 2. Бред величия
- ▣ 3. Фантастические конфабуляции
- ▣ 4. Эйфория

Парафренный синдром

- ▣ Разновидность парафренного бреда является и развивающийся у депрессивных больных ипохондрический бред Котара.
- ▣ Включает в себя нигилистический бред
- ▣ (разновидность бредовой ипохондрии) в сочетании с тяжелой депрессией. Варианты
- ▣ Бред мучительного бессмертия; Бред отрицательного могущества; бред гибели мира.