

ГБОУ СПО г. Москвы «Медицинский  
колледж №8 г. Москвы»

# АНОМАЛИИ КОНСТИТУЦИИ (ДИАТЕЗЫ)

Преподаватель учебной дисциплины  
«Сестринское дело в педиатрии»

Федирко Е. П.

02. 04. 2012 г.

# АНОМАЛИИ КОНСТИТУЦИИ (ДИАТЕЗЫ)

- **КОНСТИТУЦИЯ ОРГАНИЗМА – ЭТО КОМПЛЕКС НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗМА, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЕГО РЕАКЦИЮ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. CONSTITUTIO – СОСТАВ, УСТРОЙСТВО ОРГАНИЗМА.**

# АНОМАЛИИ КОНСТИТУЦИИ

- **АНОМАЛИИ КОНСТИТУЦИИ ИЛИ ДИАТЕЗЫ – ЭТО ОСОБОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА, КОТОРОЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕАДЕКВАТНОЙ РЕАКЦИЕЙ НА ОБЫЧНЫЕ ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ И ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗМА К ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ И ЗАБОЛЕВАНИЯМ. **DIATHESIS** – ПРЕДРАСПОЛОЖЕНИЕ, СКЛОННОСТЬ .**

# 1. ЭКСУДАТИВНО-КАТАРАЛЬНЫЙ ДИАТЕЗ

- **ЭТО ОСОБОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА, ПРИ КОТОРОМ ОТМЕЧАЕТСЯ ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК К ВОСПАЛЕНИЮ, СКЛОННОСТЬ К АЛЛЕРГИИ И ЗАТЯЖНОМУ ТЕЧЕНИЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.**
- **В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ ОН ОТМЕЧАЕТСЯ У 60-70% ДЕТЕЙ.**

# ФАКТОРЫ РИСКА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ЭКД:

- **1. СЕМЕЙНО-НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ.**
- 2. НЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ МАТЕРИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ.**
- 3. РАННЕЕ ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ РЕБЁНКА (БЕЛОК КОРОВЬЕГО МОЛОКА ЯВЛЯЕТСЯ ПИЩЕВЫМ АЛЛЕРГЕНОМ)**
- 4. НЕПРАВИЛЬНЫЙ УХОД, ПЕРЕГРЕВАНИЕ**

# ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ С РОЖДЕНИЯ



# ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКД.

- наличие себорейных, жирных чешуек (гнейс) на волосистой части головы;
- гиперемия, шелушение на коже щёк (молочный струп);
- молочница на слизистых полости рта, «географический язык»;
- упорные опрелости В СКЛАДКАХ КОЖИ даже при хорошем уходе;
- на коже всего тела появляются эритематозные и папулёзные высыпания (строфулюс);
- при сухости кожи появляются маленькие, плотные, зудящие узелки (почесуха);
- мокнущая экзема;- сухая экзема; (Исход – нейродермит)

# КЛИНИКА

- **С 2-х -3-х месяцев жизни начинаются основные проявления диатеза:**
  - **у ребёнка сильный зуд,**
  - **нарушен сон,**
  - **раздражительность,**
  - **частые капризы;**

**Обострение диатеза часто совпадает с переводом ребёнка на искусственное вскармливание или введением в пищу новых пищевых аллергенов.**

**Симптомы диатеза обычно стихают к 3-5 летнему возрасту.**

# КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

- МОЛОЧНЫЙ СТРУП



- ЭЛЕМЕНТЫ СЫПИ НА КОЖЕ



# ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ

- **ОБОСТРЕНИЕ ДИАТЕЗА ЧАСТО СОВПАДАЕТ С ВВЕДЕНИЕМ В ПИЩУ НОВЫХ ПИЩЕВЫХ АЛЛЕРГЕНОВ**



- **КРАСНЫЕ И ОРАНЖЕВЫЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЮТ ОБОСТРЕНИЕ ДИАТЕЗА**



# Аллергический диатез (атопический) АД

- **готовность организма к развитию сенсibilизации, аллергических реакций, вследствие врождённых, наследственных или приобретённых особенностей обмена веществ, иммунитета, вегетативной нервной системы.**
- **Клинические проявления АД на первом году жизни такие же, как при ЭКД.**

# ПОСЛЕДСТВИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ДИАТЕЗА

## В ДАЛЬНЕЙШЕМ:

- ДЕТИ ЧАСТО БОЛЕЮТ ОРЗ
- В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ  
РАЗВИВАЕТСЯ ЭКЗЕМА
- АСТМАТИЧЕСКИЙ БРОНХИТ
- БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА,
- ОТЁК КВИНКЕ И ДР.

# ПОСЛЕДСТВИЯ АД

- **ЭКЗЕМА  
НА КОЖЕ РУК**



- **АСТМА У МАЛЬЧИКА  
5 ЛЕТ**



# ЛИМФАТИКО-ГИПОПЛАСТИЧЕСКИЙ ДИАТЕЗ (ЛГД)

- характеризуется увеличением лимфатических узлов, вилочковой железы и дисфункцией эндокринной системы (гипофункцией надпочечников)

## **КЛИНИКА:**

- **ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС**
- **БЛЕДНОСТЬ КОЖИ,**
- **ПАСТОЗНОСТЬ**
- **УВЕЛИЧЕНЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ.**
- **УВЕЛИЧЕНА ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА.**
- **УВЕЛИЧЕНЫ МИНДАЛИНЫ И АДЕНОИДЫ**

# СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВИД РЕБЕНКА ПРИ ЛГД



Избыточный вес  
Частые простуды



Аденоиды

# НЕРВНО - АРТРИТИЧЕСКИЙ ДИАТЕЗ (НАД)

- **Характеризуется нарушением обмена веществ, преимущественно мочевой кислоты, накоплением пурина, при этом страдает липидный и углеводный обмен, нервная система. Отмечается у 4-5% детей.**

**Клиника:**

- **Повышенная нервная возбудимость  
Беспокойный сон.  
Сниженный аппетит, анорексия.  
Приступы ацетонемической рвоты.**

# НАД

Умственное и психическое развитие детей с НАД часто опережает сверстников (о них часто говорят, как о вундеркиндах)



Приступ ацетонемической рвоты

# ЛЕЧЕНИЕ ДИАТЕЗОВ.

- **1. Организовать рациональное питание.**  
Детей до 3-4 месяцев необходимо обеспечить грудным молоком.  
Из рациона матери исключить облигатные аллергены.  
При отсутствии грудного молока детям назначают молочнокислые смеси (Агуша, бифилин, биокефир и др.).  
При непереносимости коровьего молока используют смеси на соевом или миндальном молоке.

**Первый прикорм** вводят с 4-х месяцев в виде овощного пюре.

**Второй прикорм** вводят с 5 месяцев – каши.

**Третий прикорм** – с 7 месяцев вводится вываренное мясо кролика, индейки, нежирной свинины, баранины.

Супы готовят овощные вегетарианские.

Не показано введение творога, рыбы, яиц.

**Ограничивают прием воды и поваренной соли**

# .Медикаментозное лечение:

- **Антигистаминные препараты:** тавегил, супрастин, фенкарол, кларитин, кетотифен.

**Витамины.**

**Биопрепараты при неустойчивом стуле, ферментотерапия – панкреатин, абомин, фестал.**

**Местное лечение:** для снятия воспаления и зуда используют мази с анестезином, серно-салициловую мазь, мази с гормонами – гидрокортизоновую, локакортен, флуцинар и др. по назначению врача.

**Лечебные ванны с чередой, ромашкой, чистотелом, корой дуба.**

**Чтобы предотвратить кожу от расчесов, ребенку надевают матерчатые варежки или накладывают на локтевые сгибы шинки из картона.**

**Вести пищевой дневник для выявления пищевых аллергенов.**