



***ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
КРАСНУХА***

**Подготовили:
Иванова Ксения
Кузовцова Александра
Куликова Надежда**

СОДЕРЖАНИЕ

- Причина
- Проявление
- Длительность
- Осложнения
- Лечение



ПРИЧИНА

Человек, с клинически выраженной или стертой формой краснухи, является источником инфекции.

Пути передачи:

- воздушно-капельный (при разговоре с больным, поцелуях)
- вертикальный (от матери к плоду).
- через детские игрушки (Возможен также контактный путь заражения)

Вирус краснухи проникает в организм через слизистые оболочки дыхательных путей и разносится кровью по всему организму



ПРОЯВЛЕНИЕ

- Постепенно возникает лихорадка до 37,5-38°C, увеличиваются лимфоузлы в области затылка и на шее.
- Высыпания длятся до 4 суток (им предшествуют высыпания в полости рта на мягком небе, затем мелкие розовые пятна на лице, разгибательных поверхностях рук и ног и на ягодицах).
- На месте сыпи остается легкая пигментация и шелушение кожи. У взрослых на фоне краснухи могут припухать и становиться болезненными суставы.
- На подошвах и ладонях сыпь отсутствует.



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

- Инкубационный период заболевания длится от 11 до 24 дней (чаще 16-20). В последнюю неделю инкубации больной заразен для окружающих.
- В первый день болезни у 75-90% больных возникает характерная сыпь на коже.
- Сыпь держится два-три дня.

Больной становится заразным за 1 неделю до появления сыпи и продолжает выделять вирус в течение 5-7 дней после появления высыпаний. Ребёнок с врождённой краснухой выделяет возбудитель более длительное время (до 21 20 месяцев).



ОСЛОЖНЕНИЯ

- Пневмонии
- Отиты
- Артриты
- Ангины
- Тромбоцитопеническая пурпура

Осложнения краснухи крайне редки и встречаются у детей с иммунодефицитом.

Краснуха у беременных не представляет серьезной опасности для будущей матери, *но* значительно увеличивает риск пороков развития плода.



ЛЕЧЕНИЕ

- ❑ Лечение проводят симптоматически, т.к. специфических противовирусных препаратов от краснухи нет.
- ❑ Постельный режим с полноценным по возрасту питанием и обильным питьем.
- ❑ Применяют противовирусные и иммуномодулирующие препараты – арбидол, виферон, гриппферон, анаферон.
- ❑ Остальная терапия строится на основе симптомов – противокашлевые средства, средства от насморка, жаропонижающие.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

