

# ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РАССТРОЙСТВА В СТАРОСТИ

ИНТЕЛЛЕКТОМ (ЛАТ. –  
INTELLECTUS – УМ, РАССУДОК,  
РАЗУМ, ПОНИМАНИЕ, ПОЗНАНИЕ)  
НАЗЫВАЕТСЯ СПОСОБНОСТЬ К  
ПЕРЕРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
КОГНИТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОЗНАНИЕ  
СУЩНОСТИ И  
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ  
ПРЕДМЕТОВ И ЯВЛЕНИЙ,  
НАПРАВЛЕННОСТИ ИХ  
ДИНАМИКИ.

ПАТОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТА  
ПРОЯВЛЯЕТСЯ В СЛАБОУМИИ.  
СЛАБОУМИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ  
СТОЙКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ,  
УПРОЩЕННОСТЬ И  
НЕПРОДУКТИВНОСТЬ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ,  
ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ И  
БИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ.

СТАРЧЕСКОЕ СЛАБОУМИЕ-  
ТИПИЧНЫ ЛИЧНОСТНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ В ВИДЕ ВСЁ  
УСИЛИВАЮЩИХСЯ ПРОЯВЛЕНИЙ  
ЭГОЦЕНТРИЗМА БОЛЬНЫХ, ИХ  
БЕЗРАЗЛИЧИЯ К БЛИЗКИМ  
ЛЮДЯМ, НЕМОТИВИРОВАННОГО  
УПРЯМСТВА, СКУПОСТИ, ИНОГДА  
ПЕДАНТИЧНОСТИ,  
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ  
К ОКРУЖАЮЩЕМУ.





СТАРЧЕСКОЕ СЛАБОУМИЕ  
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИ  
ОТНОСИТСЯ К ГЛОБАРНОЙ  
ДЕМЕНЦИИ. НАЧИНАЕТСЯ ОНО  
ОБЫЧНО ПОСЛЕ 65 ЛЕТ.  
ОБРАЩАЕТ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ  
СНИЖЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ  
АКТИВНОСТИ, ПРИОБРЕТАЮЩЕЙ  
ЧЕРТЫ РИГИДНОСТИ.



С САМОГО НАЧАЛА СТРАДАЮТ  
ПРОЦЕССЫ ОБОБЩЕНИЯ,  
ОТВЛЕЧЕНИЯ И БОЛЬНЫЕ  
ДОВОЛЬНО БЫСТРО ПЕРЕСТАЮТ  
СПРАВЛЯТЬСЯ С ПРОСТЕЙШИМИ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  
ЗАДАЧАМИ – НЕ МОГУТ  
ПОДОБРАТЬ ОБОБЩАЮЩИХ  
НАЗВАНИЙ К НЕСКОЛЬКИМ  
ПРЕДМЕТАМ, ИСКЛЮЧИТЬ  
СХОДНОЕ ПО ПРИЗНАКАМ И Т. Д.  
ТЕРЯЕТСЯ ИНТЕРЕС К  
ОКРУЖАЮЩЕМУ.



# СЛАБОУМИЕ ПРИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА.





ВОЗНИКАЕТ ЭТОТ ВИД  
СЛАБОУМИЯ ОБЫЧНО В  
ВОЗРАСТЕ 50-60 ЛЕТ, ПРИЧЕМ  
ПОЧТИ В 10 РАЗ ЧАЩЕ У  
ЖЕНЩИН. В 25 % СЛУЧАЕВ  
ОТМЕЧАЕТСЯ НАСЛЕДСТВЕННАЯ  
ОТЯГОЩЕННОСТЬ  
ПСИХИЧЕСКИМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ





В ФОРМИРОВАНИИ СЛАБОУМИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА ВЫДЕЛЯЮТСЯ ТРИ СТАДИИ : ПЕРВАЯ (НАЧАЛЬНАЯ) – ОТМЕЧАЮТСЯ НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ИНТЕЛЛЕКТА, БЕЗ ВЫРАЖЕННЫХ ОЧАГОВЫХ СИМПТОМОВ; ВТОРАЯ – ВСЁ БОЛЕЕ НАРАСТАЮЩЕЕ СЛАБОУМИЕ, ПОЯВЛЕНИЕ ВЫРАЖЕННОЙ ОЧАГОВОЙ ПАТОЛОГИИ (АФАТИЧЕСКИЕ, АГНОСТИЧЕСКИЕ, АПРАКТИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ); ТРЕТЬЯ (ТЕРМИНАЛЬНАЯ) ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ГРУБЫМ ПСИХИЧЕСКИМ РАСПАДОМ С ПЕРЕХОДОМ НА ВЕГЕТАТИВНЫЙ ОБРАЗ СУЩЕСТВОВАНИЯ.

# СЛАБОУМИЕ ПРИ БОЛЕЗНИ ПИКА



БОЛЕЗНЬ ПИКА  
НАЧИНАЕТСЯ  
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В  
ВОЗРАСТЕ 50-60 ЛЕТ, НО  
ВСТРЕЧАЕТСЯ В 4 РАЗА  
РЕЖЕ, ЧЕМ БОЛЕЗНЬ  
АЛЬЦГЕЙМЕРА. СРЕДИ  
БОЛЬНЫХ  
ПРЕОБЛАДАЮТ  
ЖЕНЩИНЫ (5:3)