

**Контрольная работа
по дисциплине «Организация
безопасности на транспорте»
на тему : «Остановка
кровотечения»**

**Выполнила: курсант 159 группы Крылова А.А
Проверил : преподаватель Мейер О.С**

Что такое кровотечение?

капиллярные

венозные

артериальные

внутренние

Желудочно-
кишечные

**Кровотечение –
это истечение
крови из
кровеносных
сосудов при
нарушении
целости или
проницаемости
их стенок.**

Симптомы кровотечений

• Капиллярное

- менее опасное;
- поврежденных сосудов не видно;
- Останавливается самостоятельно.

- **Артериальное**
- повреждение артерий;
- ярко-алый цвет;
- пульсирующая струя;
- бледность;
- учащенный пульс;
- тошнота , рвота.

- **Венозное**
- нарушение целостности вен;
- темно вишневый цвет;
- непрерывный поток;
- давление не высокое.

- **Внутреннее**
- бледность кожных покровов;
- холодный пот;
- общее недомогание;
- головокружение;
- анемия.

- **желудочно-кишечное**
- рвота кровью;
- частое сердцебиение или пульс;
- бледность кожи;
- кал черного цвета;
- обморочные состояния

Первая помощь!


Крови мало -> опасность
инфекции -> промываем
и накладываем повязку

Фонтан -> очень быстрая
кровопотеря -> зажать
артерию, жгут

Крови много -> опасность
кровопотери -> давящая повязка

Способы остановки кровотечений.

Точки пальцевого прижатия артерий



Способы остановки кровотечений



Большое артериальное кровотечение останавливают пальцевым прижатием артерии, а затем накладывают жгут (закрутку).

В качестве закрутки можно использовать подручный материал (галстук, косынку, носовой платок и т.п.)



Наложение резинового жгута





Венозное и капиллярное кровотечение останавливают наложением давящей стерильной повязки



Наложение закрутки


Правила наложения жгута

2. Под жгут обязательно подкладывается ткань.
3. Жгут накладывается виток на виток.
4. К жгуту прикладывается записка с указанием времени наложения жгута
5. Жгут **нельзя** закрывать. Его должен сразу увидеть врач.



Общие правила наложения повязок при кровотечениях из конечности.

- Бинт подложить под конечность, немного выше места раны.
- Приложить пакет со льдом (в идеале).
- Жгут сильно растянуть.
- Завязать концы.



Действие при внутреннем кровотечении.

- вызвать «скорую»
- холод на область живота
- противошоковые меры
- транспортировать в положении

Чего не делать

- не обезболивать!
- не кормить
- не поить



Будьте ГОТОВЫ К
любой жизненной
ситуации!!!