


Лесотундра

Географическое положение

- * Лесотундра находится в субарктическом климатическом поясе

лесотундры протягиваются полосой от 30 до 300 км шириной: в Евразии от Кольского полуострова до бассейна Индигоирк



Климат

- * Средние температуры воздуха в июле 10-12 °С, а в январе от -10° до -40 °С.
- * Несмотря на малое количество атмосферных осадков (200—350 мм), для лесотундры характерно резкое превышение увлажнения над испарением, что обуславливает широкое распространение озёр — от 10 до 60 % площади подзоны. Распространено заболачивание. В питании рек преобладают талые снеговые воды, поэтому половодье на реках бывает летом, когда тают снега.

Внутренние воды

- * Лесотундра – одна из наиболее заболоченных природных зон. В отличие от тундры в ней наряду с гипновыми широко распространены сфагновые болота и начинают встречаться торфяники, иногда значительной мощности. Поверхность торфяных болот неровная: мелкие и крупные бугры чередуются с влажными мелкими озерками.

* **Сфагновые болота** — разновидность водно-болотных угодий, обычно верховых болот, преобладающая в умеренных широтах лесной и лесотундровой зон.

- * Сфагновые болота формируются во влажных низменностях и покрыты толстым покровом мхов рода сфагнум (*Sphagnum*). Под слоем мха находятся в основном кислые бескислородные воды





Флора



Полярная ива



Карликовая береза

фауна



Северный олень



Лемминг



песец



Полярная сова

Охрана лесотундры

- * Для охраны и изучения природных ландшафтов лесотундры созданы заповедники и национальные парки, в том числе Таймырский заповедник. Оленеводство и охота — традиционные занятия коренного населения, использующего до 90 % территории под олени пастбища. Вместе с северной и средней тайгой лесотундра входит в зону очагового земледелия. Здесь местами в открытом грунте выращивают картофель, капусту, лук, репу, редис, зелень.

Зрительный образ

