



Cyclin D1 (SP4)




CD5 (SP19)




CD45 (SPM496)

Лимфопротиферативті аурулардың диагностикасы



CD4 (SP35)



Дайындаған: Өмірбекова Жәния
Терапия 602-1к

Лимфопрولیферативті аурулар – гематологияның ең кең ауқымды бөлімдерінің бірі. Себебі:

Иммунды жүйені құрайтын жасушалар бүкіл ағза бойынша кең таралған және функционалді гетерогенді қасиетке ие;



Лимфопрولیферативті аурулар барлық мүшеде дамуы мүмкін;



Гистологиялық құрылымы, клиникалық көріністері және болжамы әрқалай болуы мүмкін.

Лимфопрولیферативті аурулар 2 үлкен топқа бөлінеді.



Лимфопротиферативті аурулардың Еуро-Америкалық классификациясы (по N.L.Harris et al., 1994).

1) В-жасушалы ісіктер

- I. В-лимфоциттердің ерте ізашарларының ісіктері: -- лейкемия/лимфома.
- II. Перифериялық В-жасушалы ісіктер
 1. В-жасушалы созылмалы лимфолейкоз /пролимфоцитарлы лейкоз
 2. Лимфоплазмочитарлы лимфома /иммуноцитомата.
 3. Мантиялы жасушалардың лимфомасы.
 4. Фоликулярлы орталықтың лимфомасы, субтиптері: диффузды, майдажасушалы.
 5. Маргиналды зонаның В-жасушалы лимфомасы
 6. Көкбауыр лимфомасы, маргиналды зонадағы
 8. Плазмочитомата /плазмочасушалы миелома.
 9. Ірі В-жасушаның диффузды лимфомасы, субтип: тимусты В-жасушалы лимфома;
 10. Беркитт лимфомасы.
 11. Беркитт-тәрізді жоғарғы дәрежелі қатерлі В-жасушалы лимфома;

2) Т-жасушалы ісіктер мен табиғи киллердің ісіктері

- I. Т--лимфоциттердің ерте ізашарларының ісіктері:
-- лейкемия/лимфома
- II. Перифериялық Т-жасушалы ісіктер мен табиғи киллердің ісіктері
 1. Т- жасушалы созылмалы лимфолейкоз /пролимфоцитарлы лейкоз
 2. Ірі гранулярлы лимфоциттердің лейкозы
-- Т-жасушалы тип;
-- НК-жасушалы тип;
 3. Саңырауқұлақты микоз /Сезари синдромы.
 4. Перифериялық Т-жасушалы лимфома,
Субтип: гамма, дельта гепатосплениялық Т-жасушалы лимфома.
Субтип: субкутаниальды панникулярлы Т-жасушалы лимфома.
 5. Ангиоиммунобластты Т-жасушалы лимфома.
 6. Ангиоцентрлік лимфома.
 7. Интестинальды Т-жасушалы лимфома (+/- энтеропатиямен бірге)
 8. Ересектердің Т-жасушалы лейкемиясы/лимфомасы
 9. Анапластикалық іріжасушалы лимфомасы
 10. Ходжкин-тәрізді анапластикалық іріжасушалы лимфома.

3) Ходжкин ауруы (лимфогранулематоз)

- I. Лимфогистиоцитарлы
- II. Нодулярлы склероз (склеронодулярлы).
- III. Араласжасушалы нұсқасы.
- VI. Лимфаның азаюы .
- V. Ходжкин ауруының классикалық нұсқасы.

Лимфопролиферативті аурулардың негізгі топтары:

- -- В-жасушалы лимфопролиферативті аурулар,
- -- Т-жасушалы лимфопролиферативті аурулар,
- -- лимфогранулематоз



Ходжкиндік емес лимфома

Ходжкин аруы

Ходжкиндік емес лимфомалар


- **Ходжкиндік емес лимфомалар – иммунды жүйенің зақымдануынан дамидын неопластикалық гетерогенді аурулардың тобы.**
- **Лимфа ісіктерінің жасуша бөлінуінің қай сатысында дамуы аурудың болашақ клиникалық көріністері мен болжамын анықтайды.**
- **Иммунология, цитогенетика және молекулярлы биологияның жеткен жетістіктерінің арқасында лимфоманың арнайы субтиптерін, клиникалық ағымын, терапия мен болжамын анықтай аламыз.**

Этиологиясы

Лимфома этиологиясы әлі күнге белгісіз. Әсер факторлары ретінде:

1. Иондалған радиация,
2. Химиялық канцерогендер,
3. Қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларын қарастырады.

✓ Қосымша, вирустардың да әсері бар екенін айта кету керек (алғаш рет 1964 жылы Африкада Беркетт лимфомасымен ауыратын науқастан Эпштейн-Барр вирусы бөлініп алынды).



Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ)

ВОЗдың ұсынысы бойынша лимфопролиферативті аурулар диагностикасына кіреді:

- Ісіктің морфологиялық субстратын анықтау;
- Ісік жасушаларының иммунофенотипін анықтау (иммуногистохимия, цитофлюориметрия);
- Ісіктің таралу деңгейін анықтау ;
- молекулярно-генетикалық өзгерістерді анықтау.

В-лимфоциттердің ерте ізашарларының ісіктері: лимфома

- ▣ **Бұл ауру ересектерде сирек кездеседі (10%), ал балаларда барлық ходжкиндік емес қатерлі ісіктердің 40% құрайды.**
- ▣ **ОЖЖ, лимфа түйіндері, бауыр, көкбауыр, тері, жұмсақ тіндердің зақымдануымен агрессивті түрде өтеді.**
- ▣ ***Жиі симптомдар:* артралгия, буындардағы ауру сезімі.**

Перифериялық қандағы өзгерістер:	Цитохимия:	Иммунофенотип:	Цитогенетика:
<p>анемия, және/не тромбоцитопения, және/не нейтропения, лейкоцитоз/лейкоцитопения. Лимфобласттардың морфологиясы «қол айнасы» формасында болады. Ядро формасы домалақ пішіннен дұрыс емес пішінге дейін, бұралған не қатпарлы болуы мүмкін.</p>	<p>миелопероксидаза, липидтер болмайды; PAS-оң заттары цитоплазмада не ядро айналасында майда гранула күйінде таралады немесе жасушада бірнеше ірі гранула түрінде орналасады. Лимфобласттарда қышқылды фосфатазаның белсенділігі тіркеледі.</p>	<p>лимфобласттар TdT (терминальды дезоксинуклеотидилтрансфераза — ерте ізашарларының маркері), HLA-DR, CD19, цитоплазмалық CD79a бөледі. Көп жағдайда CD10, CD24, CD20экспрессиясы, CD22 кездеседі, CD45 болмайды.</p>	<p>көптеген хромосомды аномалиялар тіркеледі, алайда тек осы ауруға тән аномалиялар жоқ.</p>

Т--лимфоциттердің ерте ізашарларының ісіктері:

- Жедел лимфобластты лейкоз балалардағы барлық жедел лимфобластты лейкоздардың 15% құрайды.
- Клиникалық көріністерінің ерекшеліктері: ісіктік үрдіске төстін, серозды қабықтардың қатысуы, превралды қуыста сұйықтық жиналады.
- Сонымен қатар теріде, лимфа түйіндерінде, бауыр, көкбауыр, Вальдейер лимфа сақинасында, ОЖЖ ісіктер орналасады.

Перифериялық қандағы өзгерістер	Цитохимия	Иммунофенотип:	Цитогенетика
Жиі гиперлейкоцитоз және ісіктік массамен көрінеді.	Т-лимфобласттар қышқылды фосфатазаның белсенділігін фокальды нүкте түрінде береді.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ лимфобласттар TdT, CD1a, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8 экспрессиялайды. ▪ CD4 и CD8 ко-экспрессиясы, CD10 экспрессия болуы мүмкін. ▪ Тимустағы дифференцировка сатысының қайсысында онкогенді трансформация жүруіне байланысты лимфобласттар әртүрлі антигендер кездесуі мүмкін: [ерте сатысында— цитоплазмалық CD3, CD2, CD7, кейінірек — CD1a, CD5 (кортикальды тимоциттер), соңғы сатысында— мембранды CD3]. 	Т-жасушалы рецепторлардың геніне әсер ететін көптеген транслокациялар тіркеледі.

В-жасушалы созылмалы лимфобластты лейкоз

Созылмалы лимфобластты лейкоз — апоптоз үрдісінің бұзылысынан дамидын ауру. Жасы 55 тен жоғары науқастар ауырады.

Бұл лейкоз барлық лейкоздардың 30% құрайды.

Клиникалық көріністері: лимфаденопатия, гепатомегалия, спленомегалия, бактериялы және вирусты инфекциялар. Көбіне созылмалы лимфобластты лейкоздың ағымы аутоиммунды аурулармен, екіншілік ісіктердің пайда болуымен, пролимфоцитарлы лейкозға (Рихтер синдромы (диффузды іріжасушалы лимфома)) немесе жедел лейкозға ауысуымен қиындай түседі.

Созылмалы лимфобластты лейкоздың диагностикалық критерийлері:

- перифериялық қандағы абсолютті лимфоцитоз—1 мкл 5000 нан жоғары;
- пролимфоциттер —10% дан төмен;
- сүйек кемігіндегі лимфоцитоз—30% дан жоғары;
- иммунологиялық фенотип — CD19+CD23+CD5+.

Перифериялық қандағы өзгерістер

Имунофенотип:

Цитогенетика

абсолютті лимфоцитоз.
Лейкоцитарлы формулада: ересек лимфоциттер 45-95%, бірен-саран пролимфоциттер, нейтропения.
Лимфоциттердің пішіні майда (7-10 мкм), дөңгелек ядролы.
Аутоиммунды гемолитикалық анемия, сирек тромбоцитопения кездеседі

ісік жасушалары В-жасуша антигендерін экспрессиялайды— CD19, CD20 (әлсіз), CD22 (әлсіз), CD79a, CD23, CD43, CD5, IgM или IgM+IgD иммуноглобулиндерінің әлсіз экспрессиясы байқалады.
Соңғы кезде леталды болжамды көрсететін ZAP-70 ақуызы (70-kD Zeta-Associated Protein) экспрессиясы зерттелуде.

1/3 жағдайда қосымша 12 хромосомасы (трисомия 12) анықталады.

Перифериялық Т-жасушалының ісіктері

Барлық қатерлі ісіктердің 15%-ы
Т-жасушаларынан түзіледі.

- ❖ Бұл ауру кейбір географиялық аймақтармен байланысты. Мысалы, Жапония және Азияның басқа да мемлекеттерінде HTLV-I (человеческим Т-лимфотропным вирусом 1-го типа) вирусымен шақырылатын Т-жасушалы лимфомалар жиірек кездеседі.

В-жасушалы пролимфоцитарлы лейкоз

**Өте сирек кездеседі. Лимфоцитарлы ісіктердің 1% құрайды.
Науқастардың орта жасы— 70 жас.**

**Көбіне спленомегалия, перифериялық лимфа түйіндерінің шамалы
үлкеюі байқалады.**

***Перифериялық қанда:* анемия және тромбоцитопения, лейкоцитоз
($\geq 100 \times 10^9/\text{л}$), пролимфоциттер $>55\%$. Сүйек кемігінде диффузды
лимфоидты инфильтрация.**

***Иммунофенотип:* CD19, CD20, CD22, CD79a и b, FMC7; CD5, M+/-D
классындағы иммуноглобулиндердің ерекше экспрессиясы тіркеледі.**

***Цитогенетика:* жиі кездесетін хромосомды аномалия — 14q+, сирек
t(11;14) транслокациясы, трисомия 12.**

T-жасушалы пролимфоцитарлы лейкоз

Өте сирек кездесетін, 70 жастан асқан адамдарда тіркелетін ауру.

- ✓ **Клиникалық көрінісі:** жайылған лимфаденопатия, эритематоз түріндегі терінің зақымдануы, папулезді бөртпелер, гепатоспленомегалия.
- ✓ Сүйек кемігінде пролимфоциттерден тұратын диффузды лимфоидты инфильтрация байқалады.
- ✓ **Перифериялық қанда** — анемия, пролимфоциттерден тұратын гиперлейкоцитоз.
- ✓ **Иммунофенотип:** ісіктік жасушалар CD2+CD3+CD5+CD7+ CD4+CD8-/+ экспрессиялайды.
- ✓ **Цитогенетика:** 14 хромосоманың аномалиясы , t(14;14). Транслокация.
- ✓ **Орташа өмір сүру ұзақтығы 7 ай.**

Беркитт Лимфомасы

Барлық қатерлі лимфомалардың 3-5% құрайды.
Ересектерде өте сирек кездеседі. Үш типі бар:

- **Эпштейн-Барр вирусымен байланыстыратын эндемиялық тип (Экваториалды Африка, Жаңа Гвинея),**
- **Барлық жер жүзінде тіркелетін спорадиялық тип (беркитт тәрізді лимфома). Еуропада, АҚШ, Ресейде өте сирек кездеседі және еректерде 1-2% құрайды;**
- **Және ВИЧ-пен байланыстыратын Беркитт лимфомасы. Балаларда Беркитт лимфомасы барлық лимфомалардың 30-50% құрайды.**

▣ *Перифериялық қан мен сүйек кемігінде:*
мономорфты лимфоидты элементтердің
инфильтрациясы, көптеген макрофагтар
кездеседі.

Иммунофенотип: ісіктік жасушалар IgM және
пан-В-жасушалы антигендерді (CD19, CD20,
CD22), CD10, Bc1б, жиі — CD21 (Эпштейн-Барр
вирусының рецепторы) түзеді.

Цитогенетика: с-тус протоонкогенінің
белсенуімен t(8;14) (q24; q32) транслокациялары
бар. Кейде t(2;8) и t(8;22) транслокациялары
табылады.

Агрессивті НК-жасушалы лейкоз

- ❑ Табиғи Т-киллерлердің лейкозы көбіне Азия елдерінде жастарда тіркеледі.
- ❑ Клиникалық көріністері: лихорадка, гепатоспленомегалия, асқазан ішек жолдарының зақымдануы, лимфаденопатия. Ауру коагулопатия, гемофагоцитарлы синдроммен, полиорганды жетіспеушілікпен асқынуы мүмкін.
- ❑ Табиғи Т-киллерлердің лейкозының патогенезінде Эпштейна-Барр вирусы негізгі рөл атқарады.
- ❑ Перифериялық қанда — анемия, абсолютті лимфоцитозбен лейкоцитоз.
- ❑ Иммунофенотип: ісік жасушалары CD2+CD16+CD56 экспрессиялайды.

Арнайы антиденелердің панелі

Антиген	Вид	Клон	Антиген	Вид	Клон	Антиген	Вид	Клон			
ALK	Rabbit	SP8	CD15	Mouse	MMA	CD138	Rabbit	Polyclonal			
		Polyclonal					Mouse	B-A38			
	Mouse	ALK-1									
Bcl-2	Rabbit	5A4	CD20	Mouse	L26	Cyclin D1	Rabbit	SP4			
					SP66				BV2		
		Polyclonal	CD21	Mouse	EP3093			Polyclonal			
		E17					2G9	Mouse	DCS-6		
Bcl-6	Mouse	124	CD23	Rabbit	1F8	EMA	Mouse	GP1.4			
					100/D5				MRQ-57	E29	
CD2	Mouse	GI191E/A8		Mouse	1B12		Mouse	MRQ-17			
CD3	Rabbit	MRQ-11	CD30	Mouse	MHM6	Granzyme B	Rabbit	Polyclonal			
					2GV6			Mouse	GZB01		
					SP7			Rabbit	Polyclonal		
	Mouse	MRQ-39	CD34	Mouse	Ber-H2	Fascin	Mouse	55k-2			
					Polyclonal				QBEnd/10		
CD4	Rabbit	PS1	CD45RO	Mouse	UHL1	Ki-67	Rabbit	SP6			
					F7.2.38				RP2/18		Polyclonal
									2B11 & PD7/26		30-9
CD5	Rabbit	SP35	CD45	Mouse	MRQ-42	MUM1	Rabbit	Polyclonal			
					1F6				123C3.D5		MRQ-43
CD7	Rabbit	SP19	CD56	Mouse	NK1	PAX-5	Rabbit	SP34			
					BV1				KP1		BV6
CD8	Mouse	4C7	CD68	Mouse	PG-M1	Perforin	Mouse	24			
					SP94				SP18		5B10
					MRQ-56				Polyclonal		MRQ-23
CD10	Rabbit	SP57	CD79a	Rabbit	JCB117	PCNA	Rabbit	Polyclonal			
					SP16				HM47/A9		Polyclonal
					C8/144B				HM57		PC10
CD99	Mouse	144B	CD99	Mouse	EPR3097Y	TdT	Rabbit	Polyclonal			
					SP67				Polyclonal		Polyclonal
					Polyclonal				O13		SEN28
	56C6			Mouse	H036-1.1	Vimentin	Rabbit	SP20			
							Mouse	V9			

**1. Лимфопролиферативті аурулар
классификациясы нешеге бөлінеді?**

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

2. Эпштейн-Барр вирусы қай лимфопротеративті ауруда бөлініп алынды?

- a) Ходжкин лимфомасы
- b) Беркитт лимфомасы
- c) Сезари синдромы
- d) Мантиялы жасушалардың лимфомасы

3. Т--лимфоциттердің ерте ізашарларының ісіктері иммунофенотиптеу әдісімен зерттеу жүргізгенде қай антиген соңғы сатысында анықталады?



- a) цитоплазмалық CD3, CD2, CD7
- b) CD1a, CD5 (кортикальды тимоциттер)
- c) мембранды CD3
- d) CD42, CD200

4. Созылмалы лимфобластты лейкоздың диагностикалық критерийі?

- a) Анемия, пойкилоцитоз, анизоцитоз;**
- b) Лейкоцитопения, тромбоцитопения, нейтропения;**
- c) Пролимфоциттерден тұратын гиперлейкоцитоз;**
- d) Абсолютті лимфоцитоз.**

5. 70 жастан асқан адамдарда тіркелетін өте сирек кездесетін ауру?

- a) Т-жасушалы пролимфоцитарлы лейкоз**
- b) В-лимфоциттердің ерте ізашарларының ісіктері**
- c) Перифериялық Т-жасушалының ісіктері**
- d) В-жасушалы созылмалы лимфобластты лейкоз**



Қолданылған әдебиеттер

- <http://www.rusmedserv.com/hematology/lymph.shtml>
- Астана Медициналық Журналы 2012 №6 (74) 70 бет
- http://www.biovitrum.ru/product/morfologiya/immunogistohimiya/pervichnye_antitela/antitela_dlya_diagnostiki_in_vitro/paneli_antitel/diagnostika_limfoproliferativnyh_zabolevanij/
- <http://meddaily.info/?cat=article&id=899>