

Медикаментозды емес терапия

- Стационарлы кезең – аурудың жедел ағымын емдеу
- Ревматологиялық санаторий кезеңі – реабилитационды іс-шаралар.
- Диспансерлық кезең –поликлиникада кардиоревматолог және педиатр бақылауында болу.
- Барлық науқастарды госпитализациялайды және оқшаулады.



Режим

- Кеселдің ауылық дәрежесіне жәненауқастың жалпы жағдайына байланысты тағайындалады.
- Қатаң төсектік режим
- Төсектік режим
- Жартылай төсектік режим
- Палаталық режим
- Еркін режим



№10

Диеталық стол

▣ **Мақсаты-** зат алмасуды және қан айналымды қалпына келтіруге бағытталған.



Медикаментозды терапия

Антибактериальді терапия:

- Бензилпенициллин 50 000 – 100 000 ЕД\кг\тәул 10 – 14 аралығында;
- Феноксиметилпенициллином 40 мг\кг\тәул 3 рет, 10 күн;
- **Жартылай синтетикалық пеницилиндер** –
- ампициллин 50 мг\кг\тәул, амоксициллин 0,125-0,5 г 3 рет, 10 күн
- **Пенициллин препараттарына қарсы реакция болса**
- эритромицин 0,4-1,0 г\тәул, 10 күн
- азитромицин 10 мг/кг 1 рет, 3 күн;
- «қорғаныс» пеницилиндер – амоксиклав, аугментин және т.б..



Стероидты қабынуға қарсы препараттар

- Преднизолон 1-2 мг\кг тәул
2-3апта толық дозада, кейін
мөлшерін ↓



Стероидты емес қабынуға қарсы препараттар

- Ацетилсалицил қышқылы - 1кг 60-100мг тәулігіне 2г артық емес, 3-4апта
- Индометацин - 1кг- 2,5-3мг тәулігіне
- Диклофенак – 2-3мг/кг тәул
- Вольтарен(ортофен) - 1кг- 3-3,5мг
- Ибупрофен(бруфен)- 400-800мг тәулігіне



Иммуномодуляторлы терапия

- Хингамин - 4мг/кг тәул
- Гидроксихлорохин – 8мг/кг тәул 6-8 ай.(кешкі уақытта)



жүрек гликозидтері және диуретиктер

- Дигоксин 0,008-0,01мг/кг тәул 2рет
- Фуросемид – 1-3мг/кг тәул 3рет
- Спиринолактон – 3,3мг/кг тәул 2-3рет



Аритмияға қарсы препараттар

- Пропранолол- 0,25-0,5мг/кг тәул 3рет
- Атенолол 50-100мг тәул



Микроэлементтер

- Панангин, аскарпам – 1-3 таб тәул
- Токоферола ацетат – 50-100мг тәул
- Эссенциале – 1-2 капсула 3рет тәул
- В тобындағы витаминдер- ішке 1 таб 2-3рет, тәул



Хорėja кезінде қосымша препараттар

- Фенобарбитал – 10-50мг 2-3рет тәул
- Диазепам -2,5-15мг 2-3рет тәул
- натрий-бромобрамид препараты- 0,1-0,3г, 3-4рет тәул
- Бромкамфора – 0,15-0,25г 2-3рет тәул
- Фенибут- 0,1-0,5г 3рет тәул
- **Физиоєм:** бром-папаверинмен мойын аймағына электрофорез қабылдау

