

# Медикаментозный аборт

Выполнила: студентка  
стоматологического факультета  
456 гр.  
Габоян Ануш Хачатуровна

**Медикаментозный аборт** – это прерывание беременности с применением лекарственных препаратов. Суть метода заключается в том, что после приема испытанного и зарегистрированного препарата (до 42 дня гестации) блокируется действие гормона беременности – прогестерона.

# Главные преимущества медикаментозного аборта:

- отсутствие хирургического вмешательства;
- менструальный цикл восстанавливается через месяц;
- психологические аспекты – возможность применения метода на ранних сроках беременности, когда эмоциональная связь матери и плода еще не окрепла; внешне последствия воспринимаются как естественный процесс обильных менструаций;
- из всех методов прерывания беременности – *медикаментозный аборт* – наименее травматичен;
- возможность предотвратить кровотечение;
- относительная безболезненность;

- высокая (до 98%) эффективность;
- с помощью медикаментозного аборта беременность можно прервать сразу же после ее выявления, другие методы можно применять только по истечении 3–4 недель;
- медикаментозный аборт не требует анестезии, что снижает риск осложнений и аллергических реакций;
- полностью исключается вероятность инфицирования, спаечного процесса, развития эндометрита;
- метод не требует нахождения в стационаре;
- минимизирован человеческий фактор (в случае механического аборта успех операции во многом зависит от опыта и мастерства хирурга, проводящего аборт);
- исключает вероятность резус-конфликта между матерью и плодом (особенно важно, когда у беременной отрицательный резус-фактор).

# Медикаментозный аборт - сроки и последствия

Наиболее эффективен **медикаментозный аборт** на сроках до 4-х недель, когда плодное яйцо еще слабо прикреплено к матке. Аборт – достаточно вредная процедура, но даже вред в тяжелых ситуациях можно контролировать и свести к минимуму (с профессиональной помощью). Препарат принимают внутрь и после этого пациентка должна быть обследована методом УЗИ. Методы аборта подразделяются на два вида: физическое повреждение половых органов и расширение шейки матки – выскабливается полость органа (и следующий за ним гормональный дисбаланс); и *медикаментозный аборт*, который по действию выгодно отличается от механического. О безопасности медикаментозного аборта говорит и тот факт, что не существует противопоказаний для проведения процедуры у подростков. Также нет прямых противопоказаний для использования медикаментозного аборта у ВИЧ-положительных женщин.

# Возможные последствия проведения механического аборта:

- травматизация шейки матки, что может привести к бесплодию;
- гормональный сбой в организме;
- появление новых или проявление вялотекущих воспалительных заболеваний как следствие снижения иммунитета;
- механический аборт оставляет рубцы и спайки в матке;
- серьезный психологический стресс;
- выраженный болевой синдром, как во время операции, так и после нее.

Несмотря на относительную безопасность метода и кажущуюся легкость его проведения, очень опасно пытаться сделать **медикаментозный аборт** вне медицинского учреждения: действие вещества подразумевает блокирование гормона беременности (прогестерона), что вызывает гибель плода; эта процедура требует тщательного медицинского наблюдения и контроля состояния здоровья женщины. К тому же, процедура имеет свои противопоказания и следует учитывать индивидуальные особенности организма, знать о которых может только врач, тщательно обследовав пациентку. Все это говорит о том, что при необходимости прервать нежелательную беременность, ни в коем случае не стоит пытаться самостоятельно проводить манипуляции со своим здоровьем: во-первых препарата, используемого для медикаментозного аборта в аптечной сети просто нет (право на его использование имеют только специализированные клиники по лицензии); во-вторых, самостоятельное использование препарата может не только не избавить от плода, но и нанести колоссальный вред организму.



Следует также отметить, что чем выше профессиональный уровень обследования здоровья пациентки, тем выше уровень безопасности и ниже уровень возможных негативных последствий после проведения процедуры. Практика медикаментозного аборта показывает, что побочные действия лишь в некоторых случаях требуют вмешательства и коррекции, иногда отмечаются: головная боль, диарея, тошнота. Болевой синдром имеет различную степень активности и нивелируется при помощи обезболивающих средств (Анальгин, Баралгин). Интенсивность кровотечений зависит, прежде всего, от срока беременности, чем срок больше, тем выделения интенсивнее. Это побочное действие корректируется с помощью препарата Окситоцин и настоя из листьев крапивы. Менструальный цикл после проведения медикаментозного аборта восстанавливается самостоятельно. В случае неполного аборта решается вопрос о вакуум-аспирации или выскабливании, прогрессирование беременности по статистике не превышает 2%.





# Этапы проведения и препараты

- осмотр врача-гинеколога;
- УЗИ–исследование для подтверждения беременности и определения ее срока;
- взятие мазка на микрофлору;
- выявление противопоказаний к применению медикаментозного аборта;
- проведение процедуры приема лекарственных средств, вызывающих аборт.


# Восстановительный период

Восстановительный период после проведения процедуры составляет около 6 часов.

**После проведения медикаментозного аборта следует учитывать следующие рекомендации:**

- необходимо полностью исключить физические нагрузки в течение двух недель после аборта;
- сексом заниматься нежелательно до наступления менструаций;
- избегать переохлаждений;
- в течение 2-х недель нельзя посещать сауну, принимать ванну (можно только теплый душ);
- запрещено принимать препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту (Аспирин и др.), т.к. она снижает abortивное действие применяемого вещества.

Препарат, используемый для проведения медикаментозного аборта – **Мифепристон**. Он открыт в 1982 году, когда группа французских исследователей сделала официальное заявление о синтезе нового вещества для проведения немеханических абортов. В 1988 году все обследования были окончательно завершены: препарат получил одобрение для применения в системе здравоохранения. Накопленный гинекологами опыт применения медикаментозного аборта позволяет сказать, что на сегодня этот метод является самым современным, эффективным и безопасным методом прекращения незапланированной беременности – это наилучшая альтернатива механическому аборту. К тому же, медикаментозный аборт – процедура недорогая, доступная. Стоимость медикаментозного аборта несколько выше, чем механического, но вред, который наносится физическим абортом, просто несопоставим с незначительными последствиями медикаментозного прерывания беременности. Особенно метод подходит для женщин, не имеющих детей (первородящих), но планирующих беременность.



# Противопоказания для медикаментозного аборта

- выявленной повышенной чувствительности организма к действующему веществу препарата (возможны аллергические реакции);
- заболеваниях системы кроветворения;
- нарушениях работы надпочечников, почек, печени;
- внематочной беременности;
- сроках задержки менструаций более 42 дней;
- тяжелых формах сердечной недостаточности, аритмии и повышенного давления;
- бронхиальной астме.