

Митральный стеноз

Жалобы

- Одышка
- Кашель
- Сердцебиение
- Слабость, быстрая утомляемость

Анамнез

- Перенесенный ревматизм
- Состоит на учете по поводу врожденного порока сердца

Объективные данные

- Акроцианоз, «митральный» румянец на щеках
- Диастолическое дрожание на верхушке сердца («кошачье мурлыканье»)
- При перкуссии: смещение правой границы сердца кнаружи от правой грудинной линии и верхней границы вверх
- При аускультации: громкий, хлопающий первый тон и слитный с ним короткий диастолический шум, тон открытия митрального клапана (громкий I тон с развоением II тона на верхушке- «ритм перепела»)

Инструментальные методы

- ЭхоКГ: площадь отверстия МК < 4-6 см, увеличение полости ЛП, дилатация ПЖ.
- R-графия грудной клетки: Митральная конфигурация сердца- увеличение тени III дуги слева, сглаженная талия сердца, увеличение II дуги справа

Принципы лечения данного синдрома

- Хирургическое лечение :
 - митральная комиссуротомия
 - протезирование МК
 - баллонная митральная вальвулопластика
 - пересадка клапана
- Лечение ХСН :
 1. Ограничение употребления соли
 2. Дозированные физические нагрузки
 3. ИАПФ (Эналаприл, лизиноприл, периндоприл)
 4. Антагонисты рецепторов ангиотензина II (валсартан, кандесартан)
 5. β -адреноблокаторы (карведилол, небиволол, бисопролол)
 6. Сердечные гликозиды (дигоксин)
 7. Диуретики