

Наркомании

- ▣ Наркомании – заболевание, развивающееся вследствие систематического употребления средств, официально включенных в государственный список наркотиков, характеризующееся патологическим влечением к ним и развитием психической, а иногда и физической зависимостью от них.
- ▣ Токсикомания - заболевание, развивающееся вследствие систематического употребления средств, характеризующееся патологическим влечением к ним и развитием психической, а иногда и физической зависимостью от них.

Наркомании

- ▣ В клинической картине этих состояний представлены три основных синдрома: Психическая, физическая зависимость и толерантность.
- ▣ Психическая зависимость- болезненное стремление постоянно принимать наркотическое средство, с тем чтобы испытать эйфороподобное состояние либо устранить явления психического дискомфорта.

Наркомании

- Клинически она выражается в обсессивном или компульсивном влечении к наркотику. Навязчивые мысли о наркотическом средстве, механизме и продолжительности его действия.
- Оно сопровождается повышенном настроением, психическим оживлением в предвкушении приема наркотика, а также подавленностью и неудовлетворенностью при невозможности его употребления.

Наркомании

- ▣ Компульсивное влечение характеризуется непреодолимым стремлением к приему наркотического средства и полной охваченностью больного им.
- ▣ Физическая зависимость- развивается в том случае, когда постоянно принимаемое наркотическое средство включается в обмен веществ и становится необходимым для нормального функционирования организма.

Наркомании

- ▣ При прекращении его приема у пациента возникают выраженные психические и соматические нарушения – абстинентный синдром. Явления абстиненции исчезают при приеме того же или сходного по химической структуре наркотика. Клинические признаки абстинентного синдрома при разных видах наркоманий различны. Следует отметить, что физическая зависимость и абстинентный синдром развиваются в процессе хронического употребления не всех наркотических средств.

Наркомании

- Толерантность (устойчивость) – состояние адаптации к наркотическим или другим психоактивным веществам.
- Плато толерантности характеризуется тем, что она на определенном этапе наркомании достигает максимума и длительное время сохраняется на одном уровне. Еще большее повышение дозы наркотика уже не вызывает эйфорию и может привести к передозировке. Снижение толерантности может наступить у

Наркомании

- ▣ больных с длительным течением наркомании.
- ▣ При одних наркоманиях (героиновой) толерантность увеличивается быстро, при этом первоначальные дозы повышаются в несколько сот раз, при других (кокаинизме) она не меняется ни качественно, ни количественно.

Наркомании

- ▣ Клинические виды наркоманий
- ▣ Препараты опия
- ▣ Снотворные и седативные средства
- ▣ Кокаин
- ▣ Каннабиноиды (препараты индийской конопли)
- ▣ Психостимуляторы
- ▣ Галлюциногены

Наркомании

- Опи́йная наркомания F11
- Опиаты относятся к классу наркотических анальгетиков. Включают обширную группу препаратов получаемых из различных разновидностей снотворного и других сортов мака, а также синтетическим путем. Среди аптечных препаратов к этой группе относят морфин, кодеин + морфин + наркотин + папаверин + тебаин, тримеперидин, нитрофурантоин, кодеин и др.

Наркомании

- В подпольных условиях изготавливают героин и метадон, а также различные вытяжки из мака.
- Препараты используют путем курения, вдыхания, приема внутрь и парентерального введения. Самым наркогенным препаратом считают героин.
- Клиническая картина.
- Отличительной особенностью этого вида наркомании – возникновение эйфории при употреблении малых доз препаратов.

Наркомании

- Фаза первичной интоксикации развивается сразу после введения препарата и манифестирует ощущением теплой и приятной волны, поднимающийся от живота к голове и заканчивается легким приятным безболезненным толчком или ударом (приход).
- Особое блаженство, неземную радость и легкое течение мыслей. Первая стадия длится от 40сек до 1-3мин

Наркомании

- ▣ Вторая стадия Эйфории («волокуша», «таска», «кайф»). Больные испытывают восторг, чрезвычайную радость, полную гармонию с миром и Вселенной. Истома и безмятежность. Состояние при этом снопоподобное, грезоподобные переживания. Внешне вялость, заторможенность и малоподвижность.
- ▣ Фаза первичной энотксикации переходит в сон в течении 2-3ч.

Наркомании

- При пробуждении больные испытывают снижение настроения с дисфорией и общим психологическим дискомфортом.
- При применении самостоятельно приготовленных препаратов из опия сырца во второй фазе грезоподобные переживания отсутствуют; характерен стимулирующий эффект. Характерно сужение зрачков, бледность и сухость кожного покрова, урежение сердечного ритма, угнетение дыхания.

Наркомании

- Сроки формирования заболевания зависят от применяемого средства и способа введения в организм.
- Стадии развития наркомании
- Развитие начальной (первой) стадии заболевания зависит от вида наркотического средства и пути введения. Для возникновения психологической зависимости достаточно нескольких в/в инъекций. С формированием психической зависимости прием становится регулярным

Наркомании

- ▣ При повторных инъекциях прежних доз наркотика их эйфоризирующий эффект снижается, что требует увеличение дозы. Её рост, как правило, отмечают через 2-3 недели после систематического употребления. При вынужденном перерыве в приеме наркотика абстиненции бывают редуцированными, стертыми, так как физической зависимости нет. Сниженное настроение, дисфория и дискомфорт. На 1ст наркомании толерантность увеличивается в 2-3раза.

Наркомании

- 2 стадия наркомании определяется физической зависимостью, которая формируется примерно через 3 нед -1,5 мес с момента начала регулярного употребления наркотика. Толерантность может возрасти в 200-300 раз.
- Изменяется характер эйфории: менее выражена или совсем отсутствует её первая фаза «приход».
- Начинает преобладать стимулирующий эффект; он становится необходимым допингом для восстановления

Наркомании

- На этой стадии тяжело протекает абстинентный синдром. Он возникает через несколько часов после лишения наркотика и выражается в весьма сильных мышечных болях, судорогах мышц конечностей, спазмах груди и животе, боли в сердце и резкой физической слабости. К ранним симптомам опиоидной абстиненции относят слезотечение, насморк с чиханием, зуд в носу и носоглотке, также к ранним симптомам опиоидной абстиненции относят зевоту, усиление перистальтики кишечника, расширение зрачков, тремор конечностей, приливы жара

Наркомании

- ▣ Нарушается сон, дисфории (ломка).
- ▣ На 4-5 день возникают диспепсические расстройства, жидкий стул, тенезмы и рвота.

Риск суицида, аффективные расстройства, дисфории.

2 стадия в среднем длится 5-10 лет.

На 3ей стадии изменяется действие наркотика. Его эйфорический эффект значительно уменьшается или исчезает.

Больные вводят наркотик для поддержания мышечного тонуса и настроения.

Наркомании

- Толерантность резко снижается; введение прежних доз вызывает тягостные ощущения. Абстинентный синдром сводится лишь к ощущениям мышечного дискомфорта. Истощение, апатия, астения.
- Лечение 1 дезинтоксикация

Наркомании

- Гашишизм (каннабиноидная наркомания) F12
- Наркотическое действие оказывают психоактивные вещества, содержащиеся в конопле – каннабиноиды.
- Наркотик, приготовленный из стеблей и листьев конопли с добавлением небольшого количества цветков, называют марихуаной (травка, сено), а смолистое вещество, собранное из верхушек травы – гашишем (анаша, план, дурь, грязь) Действие марихуаны в 10 раз слабее гашиша.

Наркомании

- Клиническая картина
- Первое в жизни курение гашиша может не вызвать никаких положительных ощущений. Эйфория в виде приятного ощущения тепла во всем теле, особой душевной легкости и чувства утраты веса. Разнообразные нарушения сенсорного синтеза: цвета кажутся необыкновенно яркими и насыщенными, а звуки – невероятно мелодичными. Искажается оценка расстояния: предметы кажутся более далекими.

Наркомании

- Опьянение всегда сопровождается приподнятым настроением, дурашливостью и смешливостью. Смех компульсивный по любым поводам. Вегетативные нарушения в виде расширения зрачков, гиперемия склер, особого блеска глаз и сухости во рту. Продолжительность составляет от 30 мин до нескольких часов. После выхода из интоксикации возникает резкое чувство голода, затем усталость и сонливость.

Наркомании

- Тяжелое (психотическое) опьянение возникает редко и связано с передозировкой. Характеризуется психомоторным возбуждением, страхом, сценоподобными зрительными галлюцинациями и слуховыми обманами.
- Описано развитие при гашишной интоксикации делирия, делириозно-онейроидного синдрома, острого параноида и состояния спутанности сознания.

Наркомании

- Эпизодическое курение препаратов конопли может быть достаточно длительным и в течении 2-3 лет не сопровождается развитием психической зависимости. Более 50% лиц, куривших коноплю, со временем бросают эту привычку, но другие переходят на более тяжелый наркотик.

Наркомании

- ▣ Абстинентный синдром – ощущением недомогания, усталости, тремором, повышенной потливостью, дисфории.
- ▣ Характерны сенестопатии в различных частях тела, стойкие болевые ощущения в мышцах и суставах. Максимальной выраженности абстинентный синдром достигает на 3-5 сутки, а его продолжительность 14суток.
- ▣ При гашишной наркомании приблизительно в 15% случаев развиваются параноидные психозы, напоминающие параноидную шизофрению.

Наркомании

- ▣ Кокаиновая наркомания F14
- ▣ Физиологические и поведенческие изменения (эйфория и т.д.) начинается через 2мин после в/в кокаина и достигают своего максимума в течении 5 -10мин. При интраназальном способе действие начинается через 5-10мин и максимально в течении 15-20мин. В течении 30 мин эффекты вещества постепенно исчезают.
- ▣ Возникает эйфория, ощущение своих повышенных возможностей, расторможенность, многоречивость и гиперактивность.

Наркомании

- ▣ Состояние кокаинового опьянения можно расценить как маниакальноподобное. Иногда развивается выраженное психомоторное возбуждение.
- ▣ При употреблении больших доз эйфория сочетается с тревогой, раздражительностью и страхом смерти.
- ▣ При передозировке могут возникнуть психотические расстройства сопровождающиеся страхами, тревогой, растерянностью, эпизодическими слуховыми и зрительными галлюцинациями.

Наркомании

- Характерны тактильные галлюцинации. Ползание насекомых по телу и под кожей. Нередко бывает кокаиновый делирий.
- При употреблении высоких доз развитие эпилептических припадков, а также сердечных аритмий.
- Отчетливых признаков физической зависимости при кокаиновой наркомании не обнаруживает.