

Обзор

**Обобщенная регрессионная
модель**

Ошибки спецификации модели

- **не включение в модель существенно влияющего фактора (факторов);**
- **включение в модель несущественно влияющего фактора (факторов);**
- **использование видов зависимостей, не соответствующих истинной форме связи.**

Обозначения

Y – вектор-столбец наблюдений
зависимой переменной

X – матрица наблюдений
независимых переменных

$\underset{A}{\Upsilon}$ – вектор-столбец оцениваемых
параметров


u – вектор-столбец остатков

Исходя из

$$Y = AX + u$$

и

$$\hat{Y} = X\hat{A}$$




$$u = Y - X\hat{A}$$

Сумма квадратов остатков

$$\begin{aligned}\sum u^2 &= u'u = (Y - XA)'(Y - XA) = \\ &= Y'Y - 2A'X'Y + AX'XA\end{aligned}$$

$$\frac{\partial(u'u)}{\partial A} = -2X'Y + 2X'XA = 0$$



$$A = (X'X)^{-1} X'Y$$

Пример

- Необходимо определить, как товарооборот сети магазинов зависит от их торговой площади и среднечасовой интенсивности потока покупателей

Магазин	Товарооборот, сотен тыс. грн.	Торговая площадь, тыс. м²	Среднедневная интенсивность потока покупателей, тыс. чел.
1	2,93	0,31	10,24
2	5,27	0,98	7,51
3	6,85	1,21	10,81
4	7,01	1,29	9,89
5	7,02	1,12	13,72
6	8,35	1,49	13,92
7	4,33	0,78	8,54
8	5,77	0,94	12,36
9	7,68	1,29	12,27
10	3,16	0,48	11,01
11	1,52	0,24	8,25
12	3,15	0,55	9,31

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0,31 & 10,24 \\ 1 & 0,98 & 7,51 \\ 1 & 1,21 & 10,81 \\ 1 & 1,29 & 9,89 \\ 1 & 1,12 & 13,72 \\ 1 & 1,49 & 13,92 \\ 1 & 0,78 & 8,54 \\ 1 & 0,94 & 12,36 \\ 1 & 1,29 & 12,27 \\ 1 & 0,48 & 11,01 \\ 1 & 0,26 & 8,25 \\ 1 & 0,55 & 9,31 \end{pmatrix}$$

$$Y = \begin{pmatrix} 2,93 \\ 5,27 \\ 6,85 \\ 7,01 \\ 7,02 \\ 8,35 \\ 4,33 \\ 5,77 \\ 7,68 \\ 3,16 \\ 1,52 \\ 3,15 \end{pmatrix}$$

$$X' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0,31 & 0,98 & 1,21 & 1,29 & 1,12 & 1,49 & 0,78 & 0,94 & 1,29 & 0,48 & 0,24 & 0,55 \\ 10,24 & 7,51 & 10,81 & 9,89 & 13,72 & 13,92 & 8,54 & 12,36 & 12,27 & 11,01 & 8,25 & 9,31 \end{pmatrix}$$

Рассчитаем произведение матриц $X'X$

$$X'X = \begin{pmatrix} 12 & 10,68 & 127,83 \\ 10,68 & 11,4058 & 118,973 \\ 127,83 & 118,973 & 1410,14 \end{pmatrix}$$

Найдем обратную матрицу

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 2,47452 & 0,18978 & -0,2403 \\ 0,18978 & 0,74547 & -0,0801 \\ -0,2403 & -0,0801 & 0,02925 \end{pmatrix}$$

Рассчитаем $X'Y$

$$X'Y = \begin{pmatrix} 63,04 \\ 66,0611 \\ 704,692 \end{pmatrix}$$

Найдем \square

$$\square A = \begin{pmatrix} -0,8319 \\ 4,74295 \\ 0,17499 \end{pmatrix}$$

Регрессионная модель

$$\hat{y} = -0,8319 + 4,74295x_1 + 0,17499x_2$$

Интерпретация модели

- при изменении размера торговой площади на одну тыс. м², при прочих равных условиях, товарооборот увеличится на 4,74 сотен тыс. грн.
- при увеличении среднедневного потока покупателей на одну тыс. чел., при прочих равных условиях, товарооборот возрастет на 0,175 сотен тыс. грн.

- **Свойства оценок параметров**

1. **несмещенность;**

2. **обоснованность;**


3. **эффективность;**

4. **инвариантность.**


- *Оценки параметров модели будут несмещенными, если математическое ожидание их выборочных значений, найденных при многократном повторении выборки, не отличается от истинного значения*

$$M(\bar{A}) = A$$

$$Y = XA + u$$




$$(X'X)^{-1}X'$$



$$(X'X)^{-1}X'Y = (X'X)^{-1}X'XA + (X'X)^{-1}X'u$$

Так как, $(X'X)^{-1}X'X = E$ то



$$M[(X'X)^{-1}X'Y] = M[A + (X'X)^{-1}X'u]$$



$$M[A] = A + (X'X)^{-1}X'M(u)$$

Учитывая

$$M(u) = 0$$



$$M\left(\begin{array}{c} \mathbb{U} \\ A \end{array}\right) = A$$

Смещение

$$Q = M(\overset{\cup}{A}) - A$$

Проверка смещенности

$$\frac{\overset{\cup}{O}}{\left| \overset{a_i}{\square} \right|} > 10\% \quad \text{????}$$

- Выборочная оценка \bar{A} называется обоснованной, если для любого сколь угодно малого числа $\varepsilon > 0$ выполняется соотношение

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \bar{A} - A \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

- Выборочные оценки вектора \hat{A} будут только тогда эффективными, когда их дисперсии будут наименьшими

Теорема Гаусса-Маркова

- функция оценивания по методу МНК покомпонентно минимизирует дисперсию всех линейных несмещенных функций вектора оценок \hat{A}

$$\sigma_{\hat{A}}^2 \leq \sigma_{\frac{A}{A}}^2$$

$\sigma_{\bar{A}}^2$ – дисперсия оценок \bar{A} ,
определенная методом 1МНК,

$\sigma_{\bar{A}}^2$ – дисперсия оценок \bar{A} ,
определенных другими способами




- Функция оценивания 1МНК в классической линейной модели является лучшей линейно несмещенной функцией оценивания
(с англ. *BLUE* – *Best Linear Unbiased Estimator*)

- Оценка \hat{A} параметров A называется инвариантной, если для произвольно заданной функции g оценка параметров функции $g(A)$ представляется в виде

$$g(\hat{A})$$


Коэффициент множественной детерминации



Коэффициент множественной корреляции



Выборочная дисперсия



Среднеквадратическое отклонение

- Коэффициенты корреляции, детерминации, эластичности

$$r_{y/x_j} = \frac{\text{cov}(x_j, y)}{\sqrt{\text{var}(x_j) \text{var}(y)}}$$

$$r_{x_j/x_l} = \frac{\text{cov}(x_j, x_l)}{\sqrt{\text{var}(x_j) \text{var}(x_l)}}$$

1. Нормировка

$$y_i^* = \frac{y_i - \bar{y}}{\sigma_y}$$

$$x_{ij}^* = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{\sigma_{x_j}}$$

2. Расчет коэффициентов парной корреляции

$$r_{y/x_j} = \frac{1}{n} (Y^*)' X_j^*$$

$$r_{x_l/x_j} = \frac{1}{n} (X_l^*)' X_j^*$$

Средние и СКО

$$\bar{y} = 5,25$$

$$\bar{x}_1 = 0,89$$

$$\bar{x}_2 = 10,65$$

$$\sigma_y = 2,11$$

$$\sigma_{x_1} = 0,4$$

$$\sigma_{x_2} = 2,01$$

Нормировка

$$y_1^* = \frac{y_1 - \bar{y}}{\sigma_y} = \frac{2,95 - 5,25}{2,11} = -1,1$$

$$y_2^* = \frac{y_2 - \bar{y}}{\sigma_y} = \frac{5,27 - 5,25}{2,11} = 0,008$$

и так далее

Нормированные значения переменных

Наблюдение	y^*	x_1^*	x_2^*
1	-1,100378	-1,457381	-0,205323
2	0,007894	0,226145	-1,564188
3	0,756214	0,804073	0,078396
4	0,831994	1,005091	-0,379536
5	0,836730	0,577927	1,526856
6	1,466645	1,507636	1,626407
7	-0,437309	-0,276400	-1,051502
8	0,244704	0,125636	0,849913
9	1,149319	1,005091	0,805115
10	-0,991445	-1,030218	0,177947
11	-1,768183	-1,633272	-1,195851
12	-0,996182	-0,854327	-0,668233

Коэффициенты парной корреляции

Матрица коэффициентов парной корреляции

$$r = \begin{pmatrix} 1 & 0,9843 & 0,65141 \\ 0,9843 & 1 & 0,5424 \\ 0,65141 & 0,5424 & 1 \end{pmatrix}$$

Коэффициент множественной детерминации

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

или

Скорректированный коэффициент
множественной детерминации (с учетом
числа степеней свободы)

$$\bar{R}^2 = 1 - (1 - R^2) \cdot \frac{n - 1}{n - k}$$

Коэффициент множественной корреляции

$$R = \sqrt{R^2}$$

$$R \geq 0$$

Магази н	y	$y - \bar{y}$	$(y - \bar{y})^2$	y^2	$y - \bar{y}$	$(y - \bar{y})^2$	$(y - \bar{y})(y^2 - \bar{y}^2)$	$y - y^2$	$(y - y^2)^2$
1	2,93	-2,32	5,40	2,4302	-2,82	7,97	6,55896	0,50	0,2498
2	5,27	0,02	0,00	5,1303	-0,12	0,02	-0,00205	0,14	0,0195
3	6,85	1,60	2,55	6,7986	1,55	2,39	2,46734	0,05	0,0026
4	7,01	1,76	3,09	7,017	1,76	3,11	3,09833	-0,01	0,0001
5	7,02	1,77	3,12	6,8809	1,63	2,65	2,87553	0,14	0,0193
6	8,35	3,10	9,59	8,6709	3,42	11,7	10,5830	-0,32	0,1030
7	4,33	-0,92	0,85	4,3619	-0,89	0,79	0,82303	-0,03	0,0010
8	5,77	0,52	0,27	5,7893	0,54	0,29	0,27690	-0,02	0,0004
9	7,68	2,43	5,89	7,4336	2,18	4,75	5,29068	0,25	0,0607
10	3,16	-2,09	4,38	3,3713	-1,88	3,54	3,93974	-0,21	0,0446
11	1,52	-3,73	13,94	1,750	-3,50	12,3	13,0790	-0,23	0,0529
12	3,15	-2,10	4,42	3,4058	-1,85	3,41	3,88594	-0,26	0,0654
Сумм а			53,50			52,9	52,8765		0,6194

$$R^2 = 0,9884$$

$$\bar{R}^2 = 0,98585$$

$$R = \sqrt{0,98842} = 0,99419314$$

**Вариация включенных в
модель факторов на
98,585% объясняет
вариацию зависимой
переменной**

Коэффициент эластичности

Средние

$$\bar{y} = 5,25333$$

$$\bar{x}_1 = 0,89$$

$$\bar{x}_2 = 10,6525$$

Коэффициенты эластичности

Увеличение торговой площади на **1%**, при прочих равных условиях, повлечет за собой рост товарооборота на **0,80353%**, а увеличение среднедневной интенсивности потока покупателей также на **1%**, при прочих равных условиях, повлечет рост товарооборота на **0,35483%**.