

# Основные теоремы о непрерывных функциях

Непрерывность элементарных функций

**Теорема** Сумма, произведение и частное двух непрерывных функций есть функция непрерывная (для частного за исключением тех значений аргумента, в которых делитель равен нулю)


**Теорема** Пусть функции  $u = \varphi(x)$  непрерывна в точке  $x_0$ , а функция  $y = f(u)$  непрерывна в точке  $u_0 = \varphi(x_0)$ . Тогда сложная функция  $f(\varphi(x))$ , состоящая из непрерывных функций, непрерывна в точке  $x_0$ .

**Теорема** Если функция  $y = f(x)$  непрерывна и строго монотонна на  $[a; b]$  оси  $Ox$ , то обратная функция  $y = \varphi(x)$  также непрерывна и монотонна на соответствующем отрезке  $[c; d]$  оси  $Oy$  (без доказательства).

# Свойства функций, непрерывных на отрезке

**Теорема (Вейерштрасса)** Если функция непрерывна на отрезке, то она достигает на этом отрезке своего наибольшего и наименьшего значений.


Для любого  $x \in [a; b]$  имеет место неравенство  $m \leq f(x) \leq M$ .



## Следствие

Если функция непрерывна на отрезке, то она ограничена на этом отрезке.

**Теорема (Больцано-Коши)** Если функция  $y = f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a; b]$  и принимает на его концах неравные значения  $f(a) = A$  и  $f(b) = B$ , то на этом отрезке она принимает и все промежуточные значения между  $A$  и  $B$ .





### Следствие

Если функция  $y = f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a; b]$  и на его концах принимает значения разных знаков, то внутри отрезка  $[a; b]$  найдется хотя бы одна точка  $c$ , в которой данная

функция  $f(x)$  обращается в нуль:  $f(c) = 0$ .

Геометрический смысл теоремы: если график непрерывной функции переходит с одной стороны оси  $Ox$  на другую, то он пересекает ось



Утверждения теорем, вообще говоря, делаются неверными, если нарушены какие-либо из ее условий: функция непрерывна не на отрезке  $[a; b]$ , а в интервале  $(a; b)$ , либо функция на отрезке  $[a; b]$  имеет разрыв.

**Пример 19.5.** Определить с точностью до  $\varepsilon = 0,00001$  корень уравнения  $e^{2x+1} + x^2 - 5 = 0$ , принадлежащий отрезку  $[0; 1]$ , применив метод половинного деления.

○ Решение: Обозначим левую часть уравнения через  $f(x)$ .

Шаг 1. Вычисляем  $\varphi = f(a)$  и  $\psi = f(b)$ , где  $a = 0$ ,  $b = 1$ .

Шаг 2. Вычисляем  $x = \frac{a+b}{2}$ .

Шаг 3. Вычисляем  $y = f(x)$ . Если  $f(x) = 0$ , то  $x$  — корень уравнения.


Шаг 4. При  $f(x) \neq 0$  если  $y \cdot \varphi < 0$ , то полагаем  $b = x$ ,  $\psi = y$ , иначе полагаем  $a = x$ ,  $\varphi = y$ .

Шаг 5. Если  $b - a - \varepsilon < 0$  то задача решена. В качестве искомого корня (с заданной точностью  $\varepsilon$ ) принимается величина  $x = \frac{a+b}{2}$ . Иначе процесс деления отрезка  $[a; b]$  пополам продолжаем, возвращаясь к шагу 2.

В результате произведенных действий получим:  $x = 0,29589$ . ●

# ПРОИЗВОДНАЯ ФУНКЦИИ

## Задачи, приводящие к понятию производной



Если в некоторый момент времени  $t$  точка занимает положение  $M$ , то в момент времени  $t + \Delta t$  ( $\Delta t$  — приращение времени) точка займет положение  $M_1$ , где  $OM_1 = S + \Delta S$  ( $\Delta S$  — приращение расстояния)

$$V_{\text{ср}} = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

Предел средней скорости движения при стремлении к нулю промежутка времени  $\Delta t$  называется *скоростью движения точки в данный момент времени* (или *мигновенной скоростью*). Обозначив эту скорость через  $V$ , получим


$$V = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t}, \quad \text{или} \quad V = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{S(t + \Delta t) - S(t)}{\Delta t}.$$

## Касательная к кривой


*Касательной к данной кривой в данной точке  $M$*  называется предельное положение  $MT$  секущей  $MM_1$ , проходящей через

точку  $M$ , когда вторая точка пересечения  $M_1$  неограниченно приближается

по кривой к точке  $M$







$$k_{\text{сек}} = \operatorname{tg} \varphi = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}. \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \operatorname{tg} \varphi = \operatorname{tg} \alpha.$$

Поэтому угловой коэффициент касательной равен

$$k = \operatorname{tg} \alpha = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \operatorname{tg} \varphi = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

К нахождению пределов приводят решения множества других задач

– если  $Q = Q(t)$  — количество электричества, проходящего через поперечное сечение проводника за время  $t$ , то *сила тока в момент времени  $t$*  равна

$$I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{Q(t + \Delta t) - Q(t)}{\Delta t};$$

– если  $N = N(t)$  — количество вещества, вступающего в химическую реакцию за время  $t$ , то *скорость химической реакции в момент времени  $t$*  равна

$$V = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{N(t + \Delta t) - N(t)}{\Delta t};$$

– если  $m = m(x)$  — масса неоднородного стержня между точками  $O(0; 0)$  и  $M(x; 0)$ , то *линейная плотность стержня в точке  $x$*  есть

$$S = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{m(x + \Delta x) - m(x)}{\Delta x}.$$

# Определение производной; ее механический и геометрический смысл.

## Уравнение касательной и нормали к кривой

Пусть функция  $y = f(x)$  определена на некотором интервале  $(a; b)$ .

Проведем следующие операции:

- аргументу  $x \in (a; b)$  дадим приращение  $\Delta x$ :  $x + \Delta x \in (a; b)$ ;
- найдем соответствующее приращение функции:  $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ ;
- составим отношение приращения функции к приращению аргумента:  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ ;
- найдем предел этого отношения при  $\Delta x \rightarrow 0$ :  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ .

Если этот предел существует, то его называют производной функции  $f(x)$  и обозначают одним из символов  $f'_x$ ,  $f'(x)$ ;  $y'$ ;  $\frac{dy}{dx}$ ;  $y'_x$ .

**Производной функции**  $y = f(x)$  **в точке**  $x_0$  называется предел отношения приращения функции к приращению аргумента, когда приращение аргумента стремится к нулю.


Итак, по определению

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad \text{или} \quad f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Функция  $y = f(x)$ , имеющая производную в каждой точке интервала  $(a; b)$ , называется **дифференцируемой** в этом интервале; операция нахождения производной функции называется **дифференцированием**.

$$k = \operatorname{tg} \alpha = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad f'(x) = \operatorname{tg} \alpha = k,$$

**производная**  $f'(x)$  **в точке**  $x$  **равна** **угловому коэффициенту касательной к графику функции**  $y = f(x)$  **в точке, абсцисса которой равна**  $x$ .



Если точка касания  $M$  имеет координаты  $(x_0; y_0)$ , то угловой коэффициент касательной есть  $k = f'(x_0)$ .

$M(x_0; y_0)$ , то уравнение касательной:

$$y - y_0 = f'(x_0) \cdot (x - x_0).$$

Прямая, перпендикулярная касательной в точке касания, называется **нормалью к кривой**.

Так как нормаль перпендикулярна касательной, то ее угловой коэффициент

$$k_{\text{норм.}} = -\frac{1}{k_{\text{кас}}} = -\frac{1}{f'(x_0)}.$$

уравнение нормали имеет вид  $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)} \cdot (x - x_0)$   
(если  $f'(x_0) \neq 0$ )


# Связь между непрерывностью и дифференцируемостью функции

**Теорема** Если функция дифференцируема в некоторой точке, то она непрерывна в ней

□ Пусть функция  $y = f(x)$  дифференцируема в некоторой точке  $x$ . Следовательно, существует предел  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x)$

Отсюда, по теореме о связи функции, ее предела и бесконечно малой функции, имеем  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \alpha$ , где  $\alpha \rightarrow 0$  при  $\Delta x \rightarrow 0$ , то есть  $\Delta y = f'(x) \cdot \Delta x + \alpha \cdot \Delta x$

Переходя к пределу, при  $\Delta x \rightarrow 0$ , получаем  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$ . А это и означает, что функция  $y = f(x)$  непрерывна в точке  $x$ . ■



Обратная теорема неверна. непрерывная функция может не иметь производной. Примером такой функции является функция

$$y = |x| = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0, \\ -x, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

функция непрерывна в точке  $x = 0$ , но не дифференцируема в ней.

*Замечания:* 1. Существуют односторонние пределы функции  $y = |x|$  в точке  $x = 0$ :  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -1$ ,  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1$ . В таких случаях

говорят, что функция имеет **односторонние производные** (или «производные слева и справа»), и обозначают соответственно  $f'_-(x)$  и  $f'_+(x)$ .

Если  $f'_+(x) \neq f'_-(x)$ , то производная в точке не существует. Не существует производной и в точках разрыва функции.

2. Производная  $y' = f'(x)$  непрерывной функции  $y = f(x)$  сама не обязательно является непрерывной.

Если функция  $y = f(x)$  имеет непрерывную производную  $y' = f'(x)$  в некотором интервале  $(a, b)$ , то функция называется *гладкой*.

## Производная суммы, разности, произведения и частного функций

Пусть функции  $u = u(x)$  и  $v = v(x)$  две дифференцируемые в некотором интервале  $(a; b)$  функции.

**Теорема** Производная суммы (разности) двух функций равна сумме (разности) производных этих функций  $(u \pm v)' = u' \pm v'$



□ Обозначим  $y = u \pm v$ . По определению производной и основным теоремам о пределах получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(u(x + \Delta x) \pm v(x + \Delta x)) - (u(x) \pm v(x))}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left( \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} \pm \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} \right) = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \pm \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} = u' \pm v', \end{aligned}$$

т. е.  $(u \pm v)' = u' \pm v'$ . ■

**Теорема** Производная произведения двух функций равна произведению производной первого сомножителя на второй плюс произведение первого сомножителя на производную второго:  $(u \cdot v)' = u'v + v'u$

а)  $(c \cdot u)' = c \cdot u'$ , где  $c = \text{const}$ ;

б)  $(u \cdot v \cdot w)' = u' \cdot v \cdot w + u \cdot v' \cdot w + u \cdot v \cdot w'$ .

**Теорема** Производная частного двух функций  $\frac{u(x)}{v(x)}$ , если  $v(x) \neq 0$  равна дроби, числитель которой есть разность произведений знаменателя дроби на производную числителя и числителя дроби на производную знаменателя, а знаменатель есть квадрат прежнего знаменателя:  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$ ,  $v \neq 0$ .

□ Пусть  $y = \frac{u}{v}$ . Тогда

$$\begin{aligned}
 y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x+\Delta x)}{v(x+\Delta x)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x)+\Delta u}{v(x)+\Delta v} - \frac{u(x)}{v(x)}}{\Delta x} = \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x) \cdot v(x) + v(x) \cdot \Delta u - u(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot \Delta v}{\Delta x \cdot (v(x) + \Delta v)v(x)} =
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v \cdot \Delta u - u \cdot \Delta v}{\Delta x \cdot (v^2 + v \cdot \Delta v)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} - u \cdot \frac{\Delta v}{\Delta x}}{v^2 + v \cdot \Delta v} = \\
&= \frac{v \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} - u \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x}}{v^2 + v \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta v} = \frac{u'v - uv'}{v^2},
\end{aligned}$$

т. е.  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ . ■

**Следствие**  $\left(\frac{u}{c}\right)' = \frac{1}{c} \cdot u'$

$$\left(\frac{c}{v}\right)' = -\frac{c \cdot v'}{v^2}, \text{ где } c = \text{const}$$