

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ

*СЛУЧАЙНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. СОБЫТИЯ И ИХ
ВЕРОЯТНОСТИ. ФОРМУЛА ПОЛНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ
И ФОРМУЛА БАЙЕСА. СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ.
ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ*

СЛУЧАЙНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

Идея случайности

Случайная изменчивость

Закономерность и случайность

НАУКА - *ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ*

**Изучением закономерностей, которые порождаются
случайными событиями**

СОБЫТИЯ И ИХ ВЕРОЯТНОСТИ

Вероятность - численная мера возможности наступления некоторого события.

A - случайное событие – вероятность данного события обозначается через $P(A)$.

для любого события A : $0 < P(A) < 1$.

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ

элементарный исход

пространство элементарных событий – Ω

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$, - *Случайные события (события),*
будем называть подмножества пространства элементарных
событий Ω .

Пространством элементарных событий называют произвольное множество Ω , $\Omega = \{\omega\}$. Элементы ω этого множества Ω называют элементарными событиями.

событие Ω называется *достоверным* событием

пустое множество \emptyset называется *невозможным* событием

противоположным (отрицанием события A) событию A называется событие, состоящее в том, что событие A не произошло. Обозначается \bar{A} , $\bar{A} = \Omega \setminus A$

несовместными событиями называются события A и B , для которых $A \cap B = \emptyset$.

объединением, или суммой, событий A и B называют событие C , которое состоит в том, что происходит хотя бы одно из событий A и B . $C = A \cup B$ или $C = A + B$.

пересечением, или произведением событий A и B называют событие C , которое состоит в том, что происходят оба события A и B . $C = A \cap B$ или $C = AB$

Разностью событий A и B называется событие, состоящее из всех элементарных событий принадлежащих A , но не принадлежащих B . Обозначается $A \setminus B$.

СВОЙСТВА ВЕРОЯТНОСТИ

$0 \leq P(A) \leq 1$ для любого события A .

**$P(A + B) = P(A) + P(B)$, если события A и B несовместимы,
а в общем случае $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.**

**Вероятность достоверного события равна 1, а
невозможного события — нулю.**

НЕЗАВИСИМОСТЬ СОБЫТИЙ

События A и B называются независимыми, если $P(AB) = P(A)P(B)$.

УСЛОВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ.

Условной вероятностью $P_A(B) = P(B|A)$ называют вероятность события B , вычисленную в предположении, что событие A уже наступило.

$$P(AB) = P(B)P(A|B) = P(A)P(B|A)$$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

ВЕРОЯТНОСТИ И ФОРМУЛА БАЙЕСА

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + \dots + P(B_n)P(A|B_n)$$

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{P(A)}, i = 1, \dots, n$$

ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

$P_\xi(X) = P(\xi \in X)$ - распределение вероятностей P_ξ на X


ВИДЫ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

дискретные

непрерывные

ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Функцией распределения $F(x)$ случайной величины ξ называют $F(x) = P(\xi \leq x)$.



ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ

Функция $p(t)$ называется плотностью вероятности в точке t (иногда — плотностью случайной величины ξ), если (для любых чисел a, b (пусть $a < b$))

$$P(a < \xi < b) = \int_a^b p(x) d(x)$$

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, СОСРЕДОТОЧЕННОГО В ДВУХ ТОЧКАХ





ГРАФИК ФУНКЦИИ ДИСКРЕТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ



ПРИМЕР НЕПРЕРЫВНОЙ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

