

Первая медицинская помощь при отравлениях



При пищевом отравлении



Первая помощь при отравлениях пищевыми продуктами – промывание желудка, для чего следует выпить несколько литров обычной, можно слегка подсоленной воды. После этого может быть назначено симптоматическое лечение пищевого отравления, прием адсорбентов, растворов, восстанавливающих водно-солевой баланс, и других препаратов.

При отравлении лекарствами



- Выяснить, какое лекарство и в какой дозе принял пострадавший. Сохранить оставшееся лекарство или упаковку от него.
- Если пострадавший в сознании вызвать рвоту, затем дать ему активированный уголь. Следить за дыханием и пульсом пострадавшего.
- При отсутствии дыхания и пульса немедленно начать реанимационные меры.
- Вызвать "скорую помощь" или доставить пострадавшего в больницу.

При отравлении угарным газом



При отравлении


- При обнаружении при отравлении ртутью необходимо промыть желудок водой, на стакан которой добавить 20 - 30 г активированного угля.
- Выпить молоко или взбитые сырые яйца с водой.
- Обязательно обратиться к врачу.

При отравлении грибами




1. Вызвать врача
2. Уложить больного в постель, промыть желудок несколько раз: дать выпить 4 - 5 стаканов воды с содой (1 ч. л. на стакан воды) или слабого раствора перманганата калия.
3. Вызвать рвоту.
4. Дать обильное питье: крепкий чай, кофе, подсоленную воду.
5. Сохранить остатки грибов для экспертизы

При отравлении ядохимикатами



1. Создать безопасную окружающую среду.
2. Произвести промывание желудка.
3. После промывания желудка дают выпить стакан воды с добавлением в него двух-трех таблеток активированного угля.
4. При кашле и раздражении в горле производят ингаляции с пищевой содой, полощут горло содовым раствором.
5. Если ядохимикаты попали в глаза, их промывают 2-процентным раствором пищевой соды.
6. На пораженные места кожи накладывают компрессы из раствора марганцовокислого калия (розового цвета).
7. После оказания первой помощи больного отправляют в ближайшее медицинское учреждение.

При отравлении никотином



Напоить пострадавшего водой (чаем или соком, но не содержащими газировку), ни в коем случае не давать молоко, помогающее усвоению организмом ядов

Вызвать рвоту (чтобы вывести яды из организма). Сначала дать отравленному попить воду, чай или сок, наклонить верхнюю часть туловища вперед, вызвать раздражение неба пальцем или чайной ложкой

Дать таблетку активированного угля (чтобы связать оставшийся в организме яд). Запивать таблетку можно водой или лимонадом