


Подготовил **Стас Лаврентьев**

Чёрная книга



ТУР.



Считается вымершим в результате хозяйственной деятельности человека и интенсивной охоты. Последняя популяция погибла в 1627 году в лесах недалеко от Якторова в 1627 году.

ПАЛЕОПРОПИТЭК

Вид лемурув, относящихся к вымершему роду, обитавшему на Мадагаскаре, были весьма пухлыми и весили до 55 килограмм. Последние упоминания относятся к 1658 году.




ДРОНТ.

Пожалуй, самый известный истреблённый вид. Обитала эта нелетающая птица на острове Маврикий. Европейские колонисты истребляли её из-за вкусного мяса, а привезённые моряками свиньи, кошки и обезьяны разоряли гнёзда дронтов, располагавшиеся на земле.



РОДРИГЕСОВ ПОПУГАЙ.



Пёстрая птичка обитала на Маскаренских островах. Предполагаемая причина исчезновения— охота.

МОРСКАЯ КОРОВА

Или Стеллерова корова. Место обитания — Командорские острова. Во многом напоминала ламантина и дюгоня, но была намного крупнее их. Большие стада этих животных плавали у самой поверхности воды, кормясь морской капустой (ламинарией), из-за чего животное и было названо морской коровой. Мясо её, которое было очень вкусным и не пахло рыбой, активно употреблялось в пищу, так что стеллерова корова была истреблена полностью всего за 30 лет несмотря на впечатляющие размеры популяции.




МОА

Обитали в Новой Зеландии. Не имели крыльев. Известны 15 видов, все вымершие: самые крупные из них достигали в высоту около 3,6 м и весили около 250 кг. Предполагается, что моа вымерли около 1500 г., уничтоженные аборигенами маори. По неподтверждённым свидетельствам, отдельные представители вида *Megalapteryx didinus* ещё встречались в конце XVIII — начале XIX века.



СУМЧАТЫЙ ВОЛК



Обитал на Тасмании и Новой Зеландии. Как следствие бесконтрольного отстрела и отлова, к 1863 г. сумчатые волки сохранились только в труднодоступных горных и лесных районах Тасмании. Катастрофическое падение его численности произошло в начале XX в., когда в Тасмании разразилась эпизоотия какой-то болезни, вероятно, собачьей чумы, занесённой привозными собаками. Сумчатые волки оказались ей подвержены, и к 1914 г. их остались считанные единицы. Последний дикий сумчатый волк был убит 13 мая 1930 года, а в 1936 г. в частном зоопарке в Хобарте умер от старости последний сумчатый волк, содержащийся в неволе.

СТРАНСТВУЮЩИЙ ГОЛУБЬ



Самым ярким и наглядным примером методичного истребления является история странствующего голубя. Когда-то многомиллионные стаи этих птиц летали в небе Северной Америки. Завидев пищу, голуби, как огромная саранча бросались вниз, а насытившись — улетали, начисто уничтожая фрукты, ягоды, орехи, насекомых. Естественно, что подобная прожорливость вызывала раздражение колонистов. Кроме того, голуби были очень хороши на вкус. Поэтому истребление голубей превратилось в забаву. Убивали столько голубей, сколько могли убить. Голубей закладывали в погреба-ледники, готовили сразу, кормили собак, или просто выбрасывали. Устраивались даже соревнования по стрельбе по голубям, а ближе к концу XIX века стали использовать и пулемёты. Последний странствующий голубь, по имени Марта, умер в зоопарке в 1914 году.

КВАГГА



Обитала на юге Африки. Квагга — едва ли не единственное из вымерших животных, представители которого были приручены человеком и использовались для охраны стад. Квагги намного раньше домашних овец, коров, кур замечали приближение хищников, и предупреждали владельцев громким криком «куаха», от которого получили своё название. Последняя квагга была убита в 1878 году.