

СТФ ахи

диффузные

дифференцированные

гиперсензитивные
следствие повышенной чувствительности к звуковым, световым и другим сенсорным воздействиям (яркий свет, резкий запах, громкий звук)


различны по своей природе

неадекватные
страх связан с реальным событием, но фиксируется только какой-то его элемент

сверхценные
пугающий объект действительно является источником определенной опасности, но занимает слишком большое место в переживаниях ребенка



$$2 + 5 = 7$$



Основные аспекты диагностических проблем

методологический

Систематический:

-МКБ - 10

-F84

-DSM-IV

-ИЦПЗ

МКБ-10

- F84- pervasive расстройства психического развития
- F84.0 - детский аутизм
- F84.1 - атипичный аутизм
- F84.2 - синдром Ретта
- F84.3 - другие дезинтегративные расстройства детского возраста
- F84.4 - гиперактивное расстройство
- F84.5 - синдром Аспергера

DSM-IV

Расстройства младенческого, детского и подросткового возраста

Первазивные расстройства развития:

- аутистическое расстройство
 - синдром Ретта
- дезинтегративное расстройство детского возраста
 - синдром Аспергера
- первазивное расстройство развития неуточненное

Центр РАМН

1. Детский аутизм эндогенного генеза

- 1.1 Синдром Каннера
- 1.2 Инфантильный аутизм
- 1.3 Детский аутизм
- 1.4 Синдром Аспергера

2. Аутистическиподобные синдромы при органическом поражении центральной нервной системы

3. Аутистически подобные синдромы при хромосомных, обменных и других нарушениях (при синдроме Дауна, при X-ФРА, фенилкетонурии, туберозном склерозе и других формах умственной отсталости)

4. Синдром Ретта (неуточненного генеза)

5. Аутистическиподобные синдромы экзогенного генеза
5.1 Психогенный парааутизм

6. Аутизм неясного генеза