


Иркутская Государственная
Сельскохозяйственная Академия

**Презентация по предмету Зоогеография:
«Скандинавско-кольская тундра»**

Выполнил: студент 3 курса
Леоненко Ф.А



Скандинавско-кольская тундра

- Скандинавско-кольская тундра, несмотря на свои небольшие размеры, населена вполне типичной тундровой фауной, которая тем не менее имеет ряд своеобразных черт.

- Здесь не только отсутствуют некоторые животные, широко распространенные по материковой тундре, но существуют свои эндемики.

Норвежский лемминг (*Lemmus lemmus*)

- норвежский лемминг не переходит горла Белого моря и замещает отсутствующих на полуострове обского и копытного леммингов.



- Европейская материковая и сибирская тундры, простирающиеся от горла Белого моря до устья Лены, имеют в общем переходную фауну.

- С одной стороны, здесь отсутствует ряд западных форм, с другой — имеются виды, общие с восточно-сибирскими тундрами, например копытный лемминг.

Копытный лемминг (*Dicrostonyx torquatus*)

- Копытный лемминг распространён в арктических областях как Старого, так и Нового света, от Аляски до полуострова Лабрадор, не исключая северного побережья Гренландии, и от восточного побережья Белого моря до Анадыря и Новой Земли



- Но, наряду с этим, есть и свои местные животные, например обский лемминг или сибирский и краснозобая казарка.

Сибирский лемминг (*Lemmus sibiricus*)

- Распространён междуречья Онеги и Северной Двины до низовьев Колымы. Южная граница ареала в основном совпадает с северным рубежом лесотундры. Отдельные изолированные популяции отмечены в редкостойной заболоченной тайге Колымской низменности.



Краснозобая казárка (лат. *Branta ruficollis*)

- ▣ Редкий вид, гнездится в тундрах на территории России, главным образом на Таймыре и соседних с ним областях. Зимует в западном Причерноморье, южном Прикаспии.



- фауна восточносибирских тундр содержит эндемичные виды (желтобрюхий лемминг, розовая чайка, куличок-лопатень)

Желтобрюхий лемминг - *Lemmus trimucronatus*

- ▣ Распространен от Колымы до Чукотки, в тундре и лесотундре, особенно многочислен в кустарниковых и кочкарных осоково-пушицевых тундрах, в широких долинах

Лемминг желтобрюхий



Розовая чайка (лат. *Rhodostethia rosea*)

- ❑ Распространена на северо-востоке Сибири (от р. Яны до западной окраины Чукотского полуострова) и Западной Гренландии. Зимой кочует в открытых водах Северного Ледовитого океана, проникая в Северную Атлантику и Берингово море. Гнездится в тундре и лесотундре по берегам озёр



Кулик-лопатень (*Eurynorhynchus pygmaeus*)

- Основные места гнездования располагаются по побережьям Чукотки, Анадырского залива и Корякского нагорья. Кулик-лопатень распространен спорадично на северо-восточном побережье п-ова Камчатка и по Олюторскому побережью.



