ПРОФИЛАКТИКА ХЛАМИДИОЗА

Выполнила

Коблова Лада

Группа 41Ф

Проверила

Лобанова Наталья Евгеньевна

Хламидиоз является одной из наиболее распространенной из передающихся половым путем бактериальных инфекций

Нечасто, но хламидии передаются и контактно-бытовым путем (через общие предметы гигиены): нередки случаи, когда дети больных хламидиозом родителей также страдают от этого заболевания.



Хламидии – облигатные внутриклеточные паразиты. В отличие от вирусов хламидии обладают ДНК, РНК и рибосомами, а по строению клеточной стенки хламидии напоминают грамотрицательных бактерий. Хламидии чувствительны к антибактериальным препаратам, в частности к тетрациклинам. В настоящее время хламидии считают бактериями и относят к порядку Chlamydiales.

Патогенные для человека хламидии поражают различные ткани и могут вызывать различные заболевания

- A,B,Ba,C — вызывают трахому;
- D,E,F,G,H,I.J,K — вызывают конъюнктивит и урогенитальные инфекции;
- L1,L2,L3 — вызывают венерическую лимфогранулему.

ДИАГНОСТИКА

Материалом для анализа на хламидии также может стать кровь, моча и сперма у мужчин.

- Микроскопический анализ **(общий мазок)** При этом виде обследования у мужчин берётся мазок из уретры, у женщин — мазки одновременно из влагалища, шейки матки и наружного отверстия мочеиспускательного канала.
- Реакция иммунофлюоресценции **(РИФ).** Взятый из уретры или цервикального канала материал окрашивают специальным веществом, потом исследуют под специальным микроскопом (так называемым флюоресцентным). Если хламидии присутствуют, то они светятся, как светлячки в объективе микроскопа. Точность этого метода — до 50 %.
- Иммуноферментный анализ **(ИФА).** Определение антител (IgG, IgA, IgM) к хламидиям в крови. Эти антитела вырабатываются организмом в ответ на инфицирование. Антитела к хламидиям выявляются при взаимодействии со специальными препаратами, содержащими хламидийные антигены, образующие с антителами прочный комплекс, который можно обнаружить разными способами.

- Полимеразная цепная реакция **(ПЦР).** Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Этот метод на сегодня обладает самой большой чувствительностью и специфичностью— до **100 %.**
- Посев на хламидии **(культуральный метод) с определением чувствительности к антибиотикам.**

ЛЕЧЕНИЕ

Поскольку *Chlamydia trachomatis* — внутриклеточный паразит, выбор препаратов ограничивается теми, которые способны проникать внутрь клетки.

- Макролиды
- Фторхинолоны
- противогрибковые препараты (флюконазол)
- иммуномодуляторы (интерферон)
- местные противомикробные препараты.

ХЛАМИДИОЗ У ДЕТЕЙ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ

-контактно-бытовым путем. Таким образом мать может заразить ребенка просто не помыв руки после туалета, либо через предметы обихода (например полотенце), через белье.

-воздушно-капельным путем(Chl. Pneumonia) . Этот возбудитель часто обнаруживают у больных острыми респираторными инфекциями.

-во время дородового периода: вирус может проникать через плаценту. Часто дети заражаются во время родов проходя через родовые пути матери, которая является носителем инфекции.

ПРОЯВЛЕНИЯ ХЛАМИДИОЗА У ДЕТЕЙ (ОТ 4 ДО 12 ЛЕТ)

- Хламидийный бронхит;
- Распираторный хламидиоз;
- Хламидиоз конъюктивит;
- Хламидийный бронхит;
- Врожденный хламидиоз;
- Урогенитальный хламидиоз.

ПРОЯВЛЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

- Конъюктевит;
- Острый средний отит;
- Бронхит;
- Пневмония;
- Назофарингит;
- Вульвовагинит.

Симптомы:

- Бледность кожных покровов;
- Вздут живот;
- Часто срыгивает;

ПРОФИЛАКТИКА ХЛАМИДИОЗА У ДЕТЕЙ

- Для предупреждения заболевания новорожденного большую роль играет своевременное выявление и лечение хламидиоза мочеполового тракта у обеих родителей. Так как наиболее часто новорожденный инфицируется во время родов (проходя через родовые пути). В этом случае (если диагноз у беременной подтвердился) в 3 триместре беременности проводят антибиотикотерапию.
- Если же ребенок родился у инфицированной и нелеченной матери, то ему назначают антибиотикотерапию вскоре после рождения.

ПРОФИЛАКТИКА ХЛАМИДИОЗА ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Про хламидиоз с уверенностью можно сказать, что его намного проще избежать, чем вылечить. Правила профилактики хламидиоза — такие же, как и для профилактики венерических заболеваний.

- Постоянный партнер, которому вы доверяете.
- Отказ от случайных половых связей или использование презерватива. Однако помните, что презерватив — эффективное, но не 100% средство защиты от венерических инфекций.
- Косвенной профилактикой хламидиоза, равно как и прочих половых инфекций, является поддержание на надлежащем уровне **иммунитета** организма.
- систематические медицинские обследования.

- Наблюдаются случаи инфицирования хламидиозом **новорожденных** в момент рождения с развитием у них конъюнктивитов и пневмоний.
- **спринцевание и обмывание** водой половых органов, является крайне **неэффективным** при хламидиозе. Совершенно ненадежным средством в данных обстоятельствах является и применение **хлорсодержащих антисептиков.**
- скрупулезное соблюдение режима гигиены.
- При малейших подозрениях на инфицирование обратитесь к врачу.