


# Растительные формации Евразии



**Растительная формация –  
классификационная  
единица растительных  
сообществ, объединение  
ассоциаций, в котором  
господствующий ярус  
образован одним видом  
растений.**

# Злаковники



Тип биома, распространённый в северном и южном полушариях. Сложился в условиях продолжительного, жаркого лета и более холодной зимы, при количестве осадков от 200 до 550 мм в год.



**Степи** – это безлесные сообщества многолетних ксерофитных трав. Степи Евразии вытянуты в виде зоны с запада на восток.

Особенность флоры – это безлесье, вызванное следующими причинами:

1. Конкуренцией трав, которые формируют мощную дернину, препятствующую прорастанию семян деревьев.

2. Если семена прорастают, то на них влияют: засоленность почв, ветры - суховеи, дефицит влаги.

Поэтому деревья растут только в оврагах, долинах рек, но часто встречаются кустарники. Травянистые растения степей очень разнообразны. В степях Евразии господствуют ковыли, пырей, мятлик, двудольные.

# Сообщества растений

в степях распространены: ковыли, типчак степной, овес степной, пырей, мятлик степной, тонконог, костры, шалфей, полыни, тимьян, горчицвет и др.



Рябчик русский

По соотношению злаков, двудольных трав и полукустарников степи делятся на **ПОДЗОНЫ**.



**Подзона северных луговых степей Евразии:** Венгерские пушты, степи Украины, степи Европейской России. Здесь много двудольных трав со злаками (больше корневищных, чем дерновинных) и примесью кустарников. Это **красочные степи**, так как с весны до конца осени до 11 раз сменяется цветной ковер (фенофазы). Имеют ярусы: верхний (100 см) – тысячелистники, хризантемы, коровяк; второй (70 см) – ковыль; третий (40 см) – типчак, шалфей, фиалки, чабрец. Продуктивность фитомассы до 110 ц/га в год.






**Подзона южных типичных степей Евразии** распространена от Украины до Маньчжурии. Там мало двудольных трав, господствуют дерновинные злаки – это **КОВЫЛЬНЫЕ степи**. Здесь больше эфемеров и меньше кустарников. На юге подзона опустынивается: появляются полукустарники (полыни) и солянки. Реже меняется облик степи – 3 раза в сезон. Продуктивность равна 80 ц/га в год.

## Зона вечнозеленых жестколистных лесов и кустарников (средиземноморская растительность)

Охватывает территории южных полуостровов Европы – Пиренейского, Апеннинского и Балканского. Первоначально здесь произрастали леса (в основном дубовые), но из-за активного антропогенного воздействия большая часть территории лишилась лесов уже в эпоху Древней Греции и Древнего Рима («козы съели Грецию»). В настоящее время в растительности господствуют вторичные растительные формации: маквис, гаррига, фригана, шибляк и др. с деревьями не более 5-7 м. высотой.



# *Средиземноморские формации:*


маквис

гаррига

шибляк

фригана

томилляры



**Маквис** – итальянское название вторичных формаций, возникающих в условиях влажного средиземноморского климата и состоящих из низкорослых деревьев и кустарников. Высота растительность 1,5-4 м. Растительность очень густая, кроны сомкнуты. Маквис покрывает нижние части гор со стороны моря. Кустарники в нем частично колючие. Многие его растения выращиваются человеком как декоративные или эфиромасличные – шалфей, лаванда. Есть виды встречающиеся повсеместно, есть характерные только для отдельных районов.



Земляничное  
дерево



Рожковое  
дерево



Фисташка

Для греческого маквиса характерны мирт, дикая фисташка, земляничное дерево, крупно- и мелкоплодная дикая маслина; из кустарников – розмарин, древовидные верески, можжевельник, каменная липа.


В итальянском маквисе к вышеназванным видам присоединяется олеандр, из кустарников: ладанник, тимьян, кермесовый дуб, кустарниковый дуб, лавр.



**Гаррига (гарига)** – это кустарниковая формация из очень низкорослых деревьев высотой не более 1,5 м. характерна для сухих районов с ГКО обычно менее 500 мм. К тому же гаррига встречается в основном на деградировавших почвах, где близко к поверхности располагаются материнские породы (в основном известняки), хорошо поглощающие воду, а это еще сильнее понижает влажность. Здесь встречаются из деревьев кермесовый дуб, из кустарников – тимьян, розмарин, испанский дрок. По внешнему виду кустарники гарриги могут иметь подушкообразную форму.




Если в гарриге доминирует тимьян, то формация называется **томилляры**. В основном эта формация встречается во внутренних районах Испании.





На Балеарских островах и в некоторых других районах могут встречаться заросли пальмы хамерокса – **ПАЛЬМИТО**.


# Положение гарриги и маквиса



**Фригана** – напоминает гаригу. Встречается в восточной части средиземноморья в основном в Греции в районах с более континентальным климатом, в основном на склонах южной экспозиции. Наряду с отсутствием деревьев есть кустарники и злаки, многолетние жесткие травы не образуют сплошную дернину. Растительный покров не сомкнут, а встречается в виде пятен на каменстом или песчаном грунте. Из кустарников имеются: окантолимон, острогал, из полукустарников: молочай, из трав: шалфей, лаванда, эспарцет, лигеум. Много эфимеров – луков и тюльпанов.




**БАЗИЛИК**



**ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ**



**РУТА ДУШИСТАЯ**



**ЛАДАННИК**



**АСТРАГАЛ  
ШЕСТИЦВЕТКОВЫЙ**

**Шибляк** – растительная формация встречающаяся на северо-востоке балканского полуострова по границе субтропического и умеренного климатических поясов. Особенность этой растительной формации – сочетание вечнозеленых и листопадных растений, причем листопадные – доминируют. Из деревьев встречаются: держидерево, дикая и обыкновенная сирень, сумак дубильный, шиповники, терен, боярышник, кустарниковый пушистый дуб, грабинник.



# Вечнозеленые жестколистные леса и кустарники Азии

Распространены на побережье Малой Азии, в Леванте (Сирия, Ливан, Израиль). Встречается только на наветренных склонах гор. Имеется маквис, который беднее европейского. Доминирует кермесовый и кустарниковый дуб, палестинская фисташка, рожковое дерево. Кроме того, встречаются можжевельник, мирт, вереск, дикая маслина. В более засушливых районах – фригана и шибляк. Доминируют держидерево, шиповник, крушина, бересклет, жасмин.

Джунгли — разговорное понятие, означающее густой и непроходимый тропический лес.

Характерные приспособления у растений:

1. непрерывная вегетация растительности в течение года;
2. разнообразие флоры, преобладание двудольных;
3. наличие 4—5 древесных ярусов, отсутствие кустарников, большое количество эпифитов, эпифаллов и лиан;
4. преобладание вечнозелёных деревьев;
5. образование цветков, а затем плодов непосредственно на стволах и толстых ветвях (каулифлория).





Мангровые леса (от англ. mangrove)  
низкоствольные (5-10 м) вечнозеленые  
леса и

кустарники, произрастающие на илистых  
тропических побережьях, защищенных от  
прибоя, но заливаемых во время прилива.



