

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ

ПОКАЗАНИЯ К РЕФРАКЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ:

- ▣ Гиперметропия любой степени
- ▣ Сложный гиперметропический астигматизм
- ▣ Простой гиперметропический астигматизм
- ▣ Смешанный астигматизм
- ▣ Миопия любой степени
- ▣ Сложный миопический астигматизм
- ▣ Простой миопический астигматизм
- ▣ **ЖЕЛАНИЕ ПАЦИЕНТА.....**

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:


□ Монокулярность



□ Глаукома



□ Катаракта



□ ЭЭД

□ Сахарный диабет




□ Кератоконус



□ Ревматоидные заболевания



□ Выраженный ССГ



□ Клиническая отслойка сетчатки

□ Выраженная диспозиция зрачка

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:


- Прогрессирование близорукости (стабильность не менее 12 месяцев)
- Возраст до 18 лет (при анизометропии и амблиопии)
- Периферические дистрофии сетчатки
- Психические заболевания
- Беременность и период лактации
- Острые глазные и общие инфекции
- Предрасположенность к келоидам кожи

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ (перед операцией):

- **Исключить ношение контактных линз в течение 2-4 недель**
- **За 2-3 дня до операции местное применение антисептиков**
- **При наличии лабильной психики применение успокоительных препаратов за неделю до операции (Ново-пассит, Персен, Афобазол)**

ФРК (фоторефрактивная кератэктомия):

- Близорукость до 3 дптр;
- Отсутствие кожных заболеваний (псориаз, угревая болезнь, келоидные рубцы кожи);



ФРК (фоторефрактивная кератэктомия):

- **долгий период реабилитации**
- **болезненность после операции (весь период эпителизации 2-4 дня)**
- **долгое восстановление зрительных функций**
- **длительный период нетрудоспособности**
- **приемлемая цена (19800 за один глаз)**



ФРК (фоторефрактивная кератэктомия):

Долгосрочное применение капель

- антибиотики (вигамокс)– первые 5-7 дней;
- гормональные препараты (максидекс) – 2 месяца
- гипотензивные препараты (тимолол, бетоптик) – 2 месяца
- слезозамещающие препараты (группа Систейн) – минимум 3 месяца

LASIK (лазерный кератомилез):

- ▣ **Гиперметропия от +0,5 до +8-9 дптр**
- ▣ **Сложный гиперметропический астигматизм**
- ▣ **Простой гиперметропический астигматизм**
- ▣ **Смешанный астигматизм**
- ▣ **Миопия -0,5 до -13-14 дптр**
- ▣ **Сложный миопический астигматизм**
- ▣ **Простой миопический астигматизм**

LASIK (лазерный кератомилез):

- ▣ Быстрый период реабилитации
- ▣ Болезненность после операции всего 2-3 часа
- ▣ Быстрое восстановление зрительных функций
- ▣ Короткий период нетрудоспособности

**Приемлемая цена
(от 26400 до 28300
за один глаз)**



LASIK (лазерный кератомилез):

Краткосрочное применение капель

- антибиотики (вигамокс) – 1 неделя
- гормональные препараты (максидекс) – 1 неделя
- гипотензивные препараты (тимолол, бетоптик) – не применяются
- слезозамещающие препараты (группа Систейн) - 3 месяца

LASIK (лазерный кератомилез):

- ▣ Ношение солнцезащитных очков с УФ фильтром 3-4 месяца – **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**
- ▣ Исключение сауны, бани
- ▣ Избегать травм головы и глаз
- ▣ Контрольный осмотр через 1 месяц

FEMTO-LASIK

Показания к операции:

- Гиперметропия
- Сложный гиперметропический астигматизм
- Простой гиперметропический астигматизм
- Смешанный астигматизм
- Миопия
- Сложный миопический астигматизм
- Простой миопический астигматизм

Фемтосекундная хирургия:

Краткосрочное применение капель

- антибиотики (вигамокс) – 1 неделя
- гормональные препараты (максидекс) – 1 неделя
- гипотензивные препараты (тимолол, бетоптик) – не применяются
- слезозамещающие препараты (группа Систейн) минимум 3 месяца

Таблица №3

**ВИЖУ
ХОРОШО
ВЫПОЛНЯЮ
УПРАЖНЕНИЯ
СОЗДАННЫЕ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
НАИЛУЧШЕГО ЗРЕНИЯ
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ НАБЛЮДАЮ
ПРОГРЕССА ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОЛУЧУ ПРЕКРАСНОЕ ЗРЕНИЕ**

**У нас есть все возможности
вернуть пациентам
максимально возможное
зрение!!!**

**Иркутский филиал МНТК
«Микрохирургия глаза»
Телефон (3952)
564-119**





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!