

РИНОЛАЛИЯ В КАРТИНКАХ

ЛОГОПЕДИЯ, ГР.2905



Врождённые расщелины верхней губы и нёба



Мальчик с расщелиной верхней губы и нёба справа в возрасте 3 месяцев



В возрасте 8 месяцев



Мальчик со сквозной расщелиной
верхней губы и нёба справа в
возрасте 5 месяцев



В возрасте 1 года 3 месяцев



Мальчик с односторонней сквозной расщелиной верхней губы и нёба в возрасте 3 месяцев



В возрасте 7 месяцев



Девочка с врождённой сквозной расщелиной верхней губы и нёба в возрасте 4 месяцев (до начала этапного лечения) и в возрасте 4,5 лет



При двусторонних сквозных расщелинах верхней губы и нёба особенно важно выполнить первичную двустороннюю хейлоринопластику в возрасте до 4-5 месяцев.



Ребёнок с двусторонней сквозной расщелиной верхней губы и нёба с выраженной протрузией межчелюстного фрагмента: в возрасте 3 месяцев – до операции, в возрасте 3 месяцев – через 10-дней после операции, в возрасте 6 месяцев.



Мальчик с врождённой двусторонней сквозной расщелиной верхней губы и нёба с протрузией межчелюстного фрагмента до лечения, в ближайшие (через 3 недели) и отдалённые сроки (через 1 и 2 года) после операции.






Мальчик с двусторонней сквозной расщелиной верхней губы и нёба, сопровождающейся протрузией и смещением от срединной линии межчелюстного фрагмента в возрасте 4 месяцев - до лечения, и после лечения - в возрасте 1,5 лет.

При сочетанном характере патологии: врождённая односторонняя изолированная расщелина верхней губы и врождённая односторонняя сквозная расщелина верхней губы и нёба не менее важным является выполнение первичной двухсторонней одноэтапной хейлоринопластики.



Мальчик с врождённой изолированной расщелиной верхней губы справа и сквозной расщелиной верхней губы и нёба слева в возрасте 3 месяцев (перед первичной двусторонней хейлоринопластикой) и в возрасте 1 года 4 месяцев после завершения базисного лечения




Врождённая расщелина мягкого и твёрдого нёба – до операции




Через 6 месяцев после пластики мягкого нёба; восстановлено: мышцы мягкого нёба, нёбный язычок и глоточное кольцо



Ширина расщелины твёрдого нёба – до начала этапного лечения



Ширина расщелины твёрдого после пластики верхней губы и мягкого нёба



Расщелина твёрдого нёба

Щадящая пластика твёрдого нёба в
возрасте 12 месяцев