



РОЗМАЇТІСТЬ ПТАХІВ
РЯД СОКОЛОПОДІБНІ

Вчитель Світова Т.

О.

Соколоподібні (Falconiformes)—

або денні хижі птахи, ряд птахів підкласу кілегрудих. Ряд включає у себе хижих птахів, багатьом з яких зараз загрожує вимирання.

Характерні гачкоподібний дзьоб, восковиця (як правило, гладенька) при основі наддзьобка, сильні пальці та гострі загнуті кігті (виключення - падальщики та птах-секретар). Поширені на усіх континентах, крім Антарктиди; відсутні на невеликих океанічних островах. Переважна більшість живляться тваринною їжею, активно ловлять живу здобич (переважно хребетних тварин) або живляться падлом. Ведуть денний (дуже рідко присмерковий) спосіб життя, тому, на відміну від сов їх нерідко називають денними хижими птахами. Моногами.

Соколоподібні - гніздові птахи. Гніздо будують один раз у кілька років. Самці у гніздовий період годують не лише пташенят, але й самку. Більшість соколоподібних - перелітні.





Яструбові (Accipitridae)

Яструбові (Accipitridae) — одна з двох головних родин ряду соколоподібних (Falconiformes) або денних хижих птахів. До родини входять багато добре відомих птахів, такі як яструби, орли, орлани канюки, луні і грифи. Більшість решти денних хижих птахів відносяться до родини соколових (Falconidae), а такі птахи як скопа і птах-секретар віднесені до окремих



Малий яструб (Accipiter nisus)

- ▣ — вид невеликих хижих птахів. В Україні гніздовий, мігруючий, зимуючий вид.

- ▣ Самки малого яструба майже удвічі більші за самців. Цей вид мешкає переважно в лісових місцевостях і поширений практично по всій Євразії. Його здобиччю є птахи малої і середньої величини. Унаслідок застосування пестицидів, в середині 20 століття чисельність малих яструбів досягла історичного мінімуму, проте з тих пір його популяція знов зростає.



Яструб-великий (*Accipiter gentilis*)

- ▣ — хижий птах роду яструбів родини яструбових ряду Соколоподібні, поширений у Європі, Азії та Північній Америці. В Україні гніздовий, кочовий, зимуючий вид.




Яструб-коротконогий (*Accipiter brevipes*)

- ▣ синоніми – яструб - тювик, тювик європейський — хижий птах роду яструбів
- ▣ Перелітний птах. У місцях гніздування з'являється у другій половині квітня. Тримається у заплавних світлих мозаїчних лісах



ОСОЇД (PERNIS)

- ▣ — рід хижих птахів родини яструбових. Складається з трьох видів ширококрилих



Гриф чорний (*Aegypius monachus*)



- ▣ — хижий птах, єдиний представник роду Гриф (*Aegypius Savigny, 1809*) родини Яструбових
- ▣ Грифи чорні також належать до корисних і рідкісних птахів. Охороняються Конвенцією з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори

Сип (Gyps Savigny, 1809)

- ▣ — рід хижих птахів родини яструбових ряду Соколоподібні
Номенклатурне зауваження:
українська назва гриф повністю відповідає латинській (Gyps) та англійським (Griffon) назвам цих птахів.
Однак оскільки в українській (та російській) мовах один з видів традиційно називають сипом білоголовим



Стерв'ятник (*Neophron percnopterus*)

- ▣ — хижий птах птах родини яструбових, єдиний представник роду стерв'ятник (*Neophron*). Охороняється Конвенцією з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори
- ▣ Поширені у південних країнах Європи, Азії, у Північній Африці



Ягнятник, гриф-ягнятник або бородач (*Gypaetus barbatus*)

— вид птахів родини яструбових (*Accipitridae*), єдиний вид свого роду *Gypaetus*. Занесений до Червоної книги Росії та інших країн, у яких гніздиться. В Україні є рідкісним залітним. Найбільш поширений на півдні Європи, в Східній і Південній Африці та у передній і Центральній Азії.



Канюк (Buteo)

- ▣ **Звичайний канюк** →
- ▣ — рід хижих птахів родини яструбових, або за старими класифікаціями канюків. Всі представники мають назву канюків, відрізняється середнім розміром, сильним тілом і широкими крилами. Широко поширений практично по всьому світу. →




▣ Африканський
рудохвостий канюк



▣ Галапагоський
канюк

▣ Канюк степовий,
або курганник




Орел (Aquila Brisson)

— рід хижих птахів родини яструбових (Accipitridae) підродини яструбових (Accipitrinae) або орлиних (Aquilinae) ,



Бойовий орел (*Polemaetus bellicosus*)




— хижий птах з родини яструбових (Accipitridae). Є єдиним видом в роді *Polemaetus*. Бойові орли зустрічаються насамперед у відкритих місцевостях Африки на південь від Сахари.



Вінценосний орел (*Stephanoaetus coronatus*)

- ▣ — великий птах родини Яструбових, єдиний представник свого роду, живе в лісних районах Африки. Полює на тварин, розмірами з мавпу або антилопу.




Орел-карлик (*Hieraaetus pennatus*)

- ▣ — невеликий орел, за розмірами близький до канюків. В Україні гніздовий, перелітний птах.



Орел-могильник або просто могильник (*Aquila heliaca*)

- ▣ — вид орлів (*Aquila*), один з 5-ти видів роду у фауні України.
- ▣ Це крупний хижий птах, що мешкає в змішаних і широколистяних лісах і полює на відкритому просторі. На півночі мігруючий, на півдні — осілий або кочуючий.



Підорлик малий (*Aquila romarina*)

- ▣ - вид хижих птахів з роду Орел родини Яструбові.
- ▣ Один з 9 видів роду, один з 5 видів у фауні України. В Україні гніздовий, перелітний птах.



Беркут (*Aquila chrysaetos*)

— один з найбільших денних хижих птахів родини яструбових. У теперішній час беркут повністю зник або став дуже рідкісним птахом у багатьох регіонах світу, більш або менш зберігся лише у горах, тундрі та у степах



Беркути



- ▣ - рід хижих птахів родини Яструбові. У межах ареалу віддають перевагу відкритим біотопам. Практично усі гніздяться на землі. Гнізда розташовують у заростях бур'янів, очерету, серед чагарників. Живляться гризунами та іншими дрібними ссавцями, птахами та їх яйцями і пташенятами, ящірками, жабами, а також великими

Лунь (Circus)



Шуліка (Milvus)

- ▣ — рід птахів родини яструбових, підродини (залежно від класифікації) справжні шуліки (*Milvinae*) або яструбові. Довжина тіла 53 — 75 см, вага до 1 кг. Рід включає два види: чорний шуліка (*M. migrans* або *M. corschun*) гніздовий птах поширений у всій Україні, крім степів на півдні; і шуліка рудий, рідкісний в Україні. Корисні птахи. Перелітні.



Змієїд, крачун (Circus gallicus)

- ▣ — хижий птах родини яструбових. Один з 4 видів роду; єдиний вид роду у фауні України.
- ▣ Перелітний птах. З'являється в кінці березня — на початку квітня. Моногам, якому властивий стійкий гніздовий консерватизм.
- ▣ Охороняється Конвенцією міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори (CITES)



Орлан (*Haliaeetus Savigny*, 1809)

- ▣ — рід хижих птахів родини яструбових (Accipitridae) ряду Соколоподібні (Falconiformes). Назва роду походить від грец. halio — «море» і -aetos — «орел» — тобто «морський орел»



Соколові (Falconidae)

— родина птахів ряду соколоподібних (Falconiformes). Містить близько 60 видів, згрупованих у 10-12 родів.

Родина соколові відрізняється від інших хижих птахів деякими анатомічними (будова скелету), морфологічними (зокрема, порядок линяння махових пер) та біохімічними особливостями (склад шкаралупи яєць). Характерна ознака, властива більшості соколиних (крім каракар та лісових соколів) - додаткові зубці на краях наддзьобка із відповідними западинами на піддзьобку.

Сокіл (Falco, староукр. раріг, рарог, балабан)

— рід хижих птахів родини соколових. Наукова назва Falco є похідною від латинського слова falx («серп») і підкреслює серпоподібну форму крил у польоті. Соколи залишили багату культурну спадщину в багатьох світових культурах, у тому числі і у в Україні.

Кречет





▣ Боривітер звичайний



Кібчик



▣

Боривітер степовий



Сапсан

Скопá (Pandion haliaetus)

- ▣ — хижий птах, єдиний вид родини скопових (Pandion).
- ▣ Це великий хижий птах з характерним забарвленням: верх чорно-сірий, низ білий з темною поперечною смугою впоперек грудей, голова біла з чорною широкою смугою через око. Крила довгі і широкі. Знизу на згинах крил темні плями. Ширяючий птах тримає крила дещо зігнутими кінцями донизу і віддалено нагадує мартина. Хвіст вузький, короткий, знизу на ньому видно нерізкі смуги. На потилиці має чуб. Очі жовті.
- ▣ Занесено до Червоної книги України



Птах-секретар (Sagittarius serpentarius)

— птах ряду соколоподібних, єдиний вид власної родини. Своєрідна назва птаха походить від чорного пір'я на голові, що нагадує гусяче пір'я, яке раніше любили вставляти в свої перуки судові секретарі. секретарі більшу частину часу проводять на землі, по якій вони можуть відносно швидко пересуватися.



Американські грифи, катартиди або грифи Нового Світу (Cathartidae)

— родина птахів яких відносять ще до ряду лелекоподібних, що мешкають в районах Північної і Південної Америки з помірним і тропічним кліматом. Представники родини характеризуються крупними розмірами і ширяючим польотом; харчуються падаллю. В результаті конвергентної еволюції вони придбали велику схожість з деякими денними хижими птахами (грифами Старого Світу), займаючи аналогічну екологічну нішу.



МИ ПІДКОРИЛИ НЕБО, МИ НАЙКРАЩІ
МИСЛИВЦІ, ЧУЙНІ БАТЬКИ ТА ПРОСТО
КРАСЕНІ, ТОМУ БАЖАЄМО ВАМ, ЩОБ ВИ
БУЛИ СХОЖІ НА НАС, ТОБТО БУЛИ
«СПРАВЖНІМИ ОРЛАМИ»



**Бажаємо успіху у вивченні
нових тем!**