


Савани



Автор:
Флисник
Анастасія)*

- В Африці савани з півночі і півдня оконтурюють область вологих тропічних лісів. Ліси в прикордонній смузі поступово разреживаються, склад їх біднішає, серед масивів суцільного лісу з'являються плями саван. Поступово вологи тропічний ліс обмежується тільки річковими долинами, а на вододілах вони заміщаються лісами, скидальними листя на суху пору року, або саванами. Зміна рослинності відбувається в результаті скорочення вологого періоду і появи сухого сезону, який у міру віддалення від екватора стає все більш тривалим.





0 Існує думка, що широке поширення вологих високотравних саван, що змінюють листопадно-вічнозелені ліси, пов'язано з діяльністю людини, яка випалював рослинність під час сухого сезону. Зникнення зімкненого деревного ярусу сприяло появі незліченних стад копитних тварин, в результаті чого відновлення деревної рослинності стало неможливим.

Ґрунти тропічних сухих саван

- 0 Червоно-бурі ґрунти сухих саван формуються в тропічному поясі при річній сумі опадів 800-1000 мм із сухим сезоном 6 місяців і більше





- Рослинність цієї зони представлена різними травами, і ще поодинці чи групами ростуть невисокі дерева .






- ❖ У сезон дощів савана покривається високою травою, яка з настанням
- ❖ посушливого періоду жовтіє і вигоряє. Землеробство в області саван майже не розвинене, і головне заняття місцевого населення – скотарство.

Тварини

Хижаків у савані багато. Це леви, гепарди, гієни тощо. Примітним звіром є також чепрачний шакал – щось середнє між лисицею й вовком. Тваринний світ савани надзвичайно багатий. Саме тут найповніше відчуваєш всю велич дикої природи Африки.





Леви

Птах-секретар годує пташеня





Великий куду



Африканські буйволи.



Бородавочник

Сезони рослинності

❖ У сухий сезон



❖ У вологий сезон





Фінікова пальма



Дум



Баобаб

Віялова



Кінець

Дякую за увагу!

